

攝津、摩耶山の苔類

Hepatics of Mt. Maya, Prov. Settsu

(by T. Shin)

新 敏 夫

筆者は先に本誌1巻第5号に攝津摩耶山の蘚類と題して、摩耶山の蘚類フロラを紹介しておいたが、今度は苔類について記すことにする。1947年3月30日、蘚類採集のかたわら採集した46包の中から次に記す22種を検出したもので、勿論、この山の苔類の全部でないことは明らかで、更に詳しく調査すれば、なお多くの種が追加されると思うが、次の機会にゆすることにして、只1回の採集行で判明したものだけを記して、摩耶山苔類相究明の一資料とする。

なおこの機会に堪えず激励、指導して下さいる広島文理大、堀川芳雄教授と宮崎県日南市在住の服部新佐氏に感謝の意を表す。

○ Fam. Lepidoziaceae

1. *Bazzania albicans* Stephani

和名 ムカデゴケ、シロムチゴケ

(No. 2958, 2966, 2969, 2970, 2971, 2973)

分布 本州、四国、九州、琉球、台湾に普通に産し、又支那にも知られている。

2. *Lepidozia vitrea* Stephani

和名 コスギバゴケ、エダウロコゴケ、オオスギゼニゴケ

(No. 2965)

分布 本州、四国、九州、琉球、台湾に普通に産する。

○ Fam. Epigonanthaceae

3. *Plectocolea radiculosa* (Mitten) Mitten

和名 オオツボミゴケ

(No. 2957)

分布 ヒマラヤ、スマトラに分布し、日本では本州、四国、九州に産する。

○ Fam. Harpantaceae

4. *Heteroscyphus planus* (Mitten) Schiffner

和名 ツクシウロコゴケ

(No. 2974)

分布 本州、四国、九州、琉球、及び南支に分布する。

5. *Lophocolea minor* Nees

和名 ヒメニオイウロコゴケ、ヒメトサカゴケ

(No. 2937)

分布 北米、欧州、シベリア、支那、朝鮮等に広く分布し、我国でも本州、四国、九州に普通に見られる。

○ Fam. Scapaniaceae

6. *Scapania Stephanii* C.Müller

和名 チャボヒシヤクゴケ

(No. 2951)

分布 日本特産にして本州、四国、九州より知られる。

7. *Scapania Parvitexta* Stephani

和名 コアミメウロコゴケ、コアミメヒシヤクゴケ

(No. 2956)

分布 日本特産で北海道、本州、四国、九州より知られる。

○ Fam. Marsupellaceae

8. *Marsupella tubulosa* Stephani

和名 タカネミゾゴケ

(No. 2976)

分布 日本特産で本州、四国、及び九州に産する。

○ Fam. Radulaceae

9. *Radula oyamensis* Stephani

和名 ヒメマルバウロコゴケ、ヒメケビラゴケ

(No. 2952)

分布 日本特産にして、本州(相模、大山)、四国(土佐及び伊予)、九州(日向、大隅、薩摩)より知られている。

○ Fam. Porellaceae

10. *Maevicaria ulophylla* (Stephani) S. Hattori

和名 チヂミムカデゴケ、ノリウロコゴケ、チヂミカヤゴケ

(No. 2945, 2946)

分布 本州、四国、九州及び朝鮮に普通に見られ、満洲及び支那にも産する。

○ Fam. Lejeuneaceae

11. *Brachiolejeunea sandvicensis* (Gottsche) Evans

和名 ヤマトチヂレウロコゴケ

(No. 2933, 2950, 2975)

- 分布 琉球、台湾、支那、ジャワ、ハワイ其の他熱帯乃至温帯に広く分布し、本邦でも本州、四国、九州、屋久島等に普通。
12. *Cololejeunea minuta* (Mitten) Stephani
和名 ヒメグサリゴケ、ヒメケクサリゴケ。
(No. 2949)
分布 本州、四国、九州、屋久島、琉球、台湾、及び朝鮮に産する。
13. *Lejeunea nipponica* S. Hattori
和名 ヤマトコミミゴケ
(No. 2940)
分布 1944年、服部新佐氏により南九州（日向、大隅）の標本により作られた種名であるが本州からは初めての報告である。
14. *Lejeunea vaginata* Stephani
和名 カマハコミミゴケ
(No. 2934, 2936, 2955)
分布 日本特産種で従来四国（土佐）、九州（日向、大隅）から報告されている。本州から初めての報告である。筆者は南九州の薩摩でも採集している。
- Fam. *Frullaniaceae*
15. *Frullania pedicellata* Stephani
和名 クロアオヤスデゴケ
(No. 2935, 2942, 2948)
分布 日本特産、確実な産地は四国（土佐）、九州（日向、大隅、薩摩）で、本州からは初めての報告である。
16. *Frullania Makinoana* Stephani
和名 マキノヤスデゴケ
(No. 2941)
分布 日本特産種で本州、四国、九州、対馬から知られている。
17. *Frullania moniliata* (Reinwardt, Blume et Nees) Montagne subsp. *obscura* Verdoorn
和名 エダウチヤスデゴケ
(No. 2944, 2961, 2962, 2964, 2968)
分布 印度、セイロン、スマトラ、ジャワ、支那、台湾、朝鮮、琉球、日本（北海道—九州）。
18. *Frullania sguarrosa* (Reinwardt, Blume et Nees) Dumortier
和名 ミドリヤスデゴケ
(No. 2947)
分布 熱帯暖帯地方に広く分布する。日本では本州、四国、九州より知られている。
19. *Frullania parvistipula* Stephani
和名 ヒメアカヤスデゴケ
(No. 2953)
分布 日本特産、本州（仙台）、四国（土佐）、九州（日向、薩摩）に知られている。本州からは2回目の報告である。
- Fam. *Metzgeriacericeae*
20. *Metzgeria himalayensis* Kashyap
和名 ヒマラヤカズノゴケ
(No. 2954)
分布 印度、ビルマに分布する。日本では南九州には広く分布している。本州から初めての報告である。
- Fam. *Marchantiaceae*
21. *Conocephalum conicum* (Linne) Necker
和名 ジャゴケ
(No. 2967)
分布 北米、歐洲、シベリヤ、ヒマラヤ、支那、台湾等に広く分布し日本列島でも北は樺太千島より南は台湾まで極めて普通に見られる。
- Fam. *Operculaceae*
22. *Reboulia hemisphaerica* (Linne) Raddi
和名 ウラベニゼゴケ、ヒメゼゴケ
(No. 2943)
分布 亞細亞、アフリカ、歐洲、北米、中南米、濠洲、ニュージーランド等、殆んど全世界に分布す。日本列島でも北海道から台湾まで、朝鮮にも広く知られている。（終り）

(147頁より続く)

Loxogramme Saziran Tagawa サジラン 音水、赤西

Drymotaenium Miyoshianum (Makino) Makino
グラガリシダ 音水、赤西（稀）

Pyrosia linearifolia (Hook.) Ching ピロウドシダ
音水
追加

Loxogramme grammitoides C. Chr. ヒメサジラン
音水（昭和6年8月19日、米沢新治氏採集）