

近畿地方植物誌 (6)

村 田 源

406. *Tubocapsicum anomalum* (Fr. et Sav.) Makino
ハダカホオズキ Ⅷ—Ⅹ、(京)比叡山、鞍馬、貴船、
高雄、妙高山、(奈)高見村、多武峯、(兵)再度山、
(和)那智、高野山、(三)尾鷲、阿波村。北→九、朝、
満、支。(牧野図鑑476図、北村原色合弁391)

18 Labiatae シソ科

407. *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze
カワミドリ 香氣あり、Ⅷ—Ⅹ、(京)貴船、君尾山、
花背、(兵)猪鼻谷(淡)、氷ノ山、朝来町、(奈)五社
峠。北→九、台、朝、満、支。(牧野図鑑531図、北村
原色合弁478)
408. *Ajuga decumbens* Thunb. キランソウ 茎は地
にはう、Ⅰ—Ⅴ、(京)下加茂、黒谷、旭村、三岳山、
嵐山、比叡山、(滋)永源寺、(大)箕面、(兵)白髪岳、
(奈)柏木、宇賀志村、(三)須賀利村、柘植、有井村、
朝熊山。本→九、朝、満、支。(牧野図鑑546図、北村
原色合弁470)
f. *albiflora* Honda シロバナキランソウ (和)西ノ
峯。
409. *A. japonica* Miq. オウギカズラ 走出枝を出し
花は長さ約2.5cm、Ⅳ—Ⅴ、(三)大杉谷、(奈)西原、
和龍神村。本→九。(牧野図鑑550、北村原色合弁467)
410. *A. mixta* Makino ジュウニキランソウ (ジュ
ウニヒトエ×キランソウ) Ⅳ—Ⅴ、(京)北白川。本。
411. *A. nipponensis* Makino ジュウニヒトエ 茎は
斜上し全体白毛多し、花は淡紫色、Ⅳ—Ⅴ、(京)北白
川、大文字山、比叡山、胡麻郷村、西本梅村、(兵)六
甲山、鉄拐山、広石村、村岡町。本、四。(牧野図鑑
547、北村原色合弁474)
412. *A. shikotanensis* Miyabe et Tatew. f. *hirsuta*
(Honda) Murata ケバカツルカコソウ 走出枝を出
し毛多し、Ⅴ—Ⅶ、(和)潮岬、(三)稲生村。本、千。
(牧野図鑑549、北村原色合弁468)
413. *A. yezoensis* Maxim. ニシキゴロモ 株立ちと
なる、Ⅳ—Ⅴ、(京)比叡山、大文字山、醍醐山、愛宕
山、知井村、頭巾山、(兵)城崎郡大岡山、六甲山、
(滋)山内村、伊吹山、(三)御在所山、三田村、鎌ヶ
岳、治田峠、(大)葛城山、(奈)奈良。北→九。(牧野
図鑑548図、北村原色合弁473)
414. *Chelonopsis moschata* Miq. ジャコウソウ Ⅷ
—Ⅹ、(京)貴船、鞍馬、比叡山、大原野村、長老岳、
青葉山、大鼓山、(兵)三方村、妙高山、六甲山、赤西

- 国有林、和田村、杉原谷村、(三)森村、大合ヶ原、野
登山、(和)八幡村、雲取山、三川村。(牧野図鑑527
図、北村原色合弁440)
415. *Clinopodium chinense* (Benth.) O. Kuntze
subsp. *grandiflorum* (Maxim.) Hara var. *paruifl-*
orum (Kudo) Hara クルマバナ 花は長さ8—12m
m、がくは腺毛がなく、小苞は長い、Ⅷ—Ⅹ、(京)比
叡山、大悲山、深見峠、知井村、湊村、(滋)伊吹山、
今津町、(大)堺、(兵)雪彦山、千種村、西床尾山、
(奈)弥山、大合ヶ原、(和)北山村。北→九、朝、千。
(牧野図鑑509図)
var. *shibetschense* Koidz. ヤマクルマバナ 全体軟
弱、花は淡色、Ⅷ—Ⅹ、(滋)大津、川上村、伊吹山、
北比都佐村、西大路村、比叡山、(京)知井村、(大)箕
面、妙見山、(兵)氷ノ山、(奈)西原。北→九、朝、支。
416. *C. gracile* (Benth.) O. Kuntze トウバナ 葉
は腺点なく、花は長さ5—6mm、小苞は小形、Ⅴ—
Ⅷ、(京)大文字山、宇治、下加茂、福知山、(大)牧
方、高槻、(奈)山上岳、(滋)北比都佐村、比良山、
(兵)船越山。本→台、朝、支、マレー、ジャバ、印。
(牧野図鑑507、北村原色合弁435)
417. *C. micranthum* (Regel) Hara イヌトウバナ
葉裏腺点多く、小苞はごく小形、花は長さ6—7mm、
がくに開出毛多し、Ⅷ—Ⅹ、(京)大悲山、花背峠、鞍
馬、知井村、五箇村、(奈)春日山、川上村、弥山、大
合ヶ原、(和)那智、大塔山、(三)船津、新宮、阿波
村、尾鷲、大杉谷、治田峠、上津村、(滋)比良山、
(兵)雪彦山。北→九。(北村原色合弁436)
418. *C. multicaule* (Maxim.) O. Kuntze ヤマトウ
バナ 花は長さ7—9mm、葉裏腺点は目立たない、Ⅶ
—Ⅷ、(京)比叡山、大原野村、大江町、(滋)比良山、
城山国有林、大物峠、(兵)常隆寺山(淡)、六甲山、船
越山、(大)岩湧山、金剛山、(奈)天川村、十津川村、
(三)野登山、御在所山。本(中部以西)→九。(牧野図
鑑508、北村原色合弁438)
var. *minimum* (Hara) Ohwi コケトウバナ 葉は
長さ4—7mm、(奈)春日山。本(奈良県、屋久島)。
(原：植物研究雑誌 Ⅸ, 109 f. 18)
419. *C. sachalinense* (Fr. Schm.) Koidz. ミヤマト
ウバナ 花は5—6mm、がくはまばらに短毛あり、花
穂は長くまばらに断続し葉腋からもでる、Ⅷ—Ⅹ、
(兵)氷ノ山、(京)芦生。本(近畿北部以東)、北、千、
樺。(北村原色合弁437)

420. *Comanthosphace japonica* (Miq) S. L. Moore
テンニンソウ 葉は細く、花は黄色、Ⅴ—Ⅹ、〔滋〕伊吹山、比良山、〔京〕大悲山、知井村、長老岳、雲ヶ畑、〔兵〕赤西国有林、〔三〕湯ノ山、〔奈〕吉野。北→九。〔牧野図鑑489、北村原色合弁429〕

f. *barbinervis* (Miq.) Kitam. フジテンニンソウ
葉裏中肋上に開出剛毛あり、〔滋〕伊吹山、〔京〕貴船、久多、〔奈〕大台ヶ原、〔兵〕氷ノ山、赤西国有林。

421. *C. stellipila* (Miq.) S. L. Moore²⁴⁾ ミカエリソウ
花は紅紫色、葉裏は星状毛密布、Ⅸ—Ⅹ、〔京〕比叡山、貴船、鞍馬、愛宕山、嵐山、雲ヶ畑、足占山、〔大〕葛城山、ポンポン山、〔兵〕小金岳、雪彦山、奥谷村、高仙寺山、生野、摩耶山、〔滋〕綿向山、〔京〕多武峯、吉野、白川渡、川上村、〔和〕虎ヶ峯、那智、高野山、〔三〕大又、多度山、上津村、大台ヶ原、尾鷲、熊野。本(福井県以西)。〔牧野図鑑490図、北村原色合弁428〕

f. *albiflora* Yatoh シロバナミカエリソウ 〔京〕嵐山、〔三〕平倉山 (Type)²⁵⁾

422. *Dysophylla verticillata* (Roxb.) Benth. ミズネコノオ 1年草、花穂は細く、花糸にはまばらに短毛あり、Ⅷ—Ⅹ、〔滋〕西庄村、野洲、〔兵〕滝野、〔三〕有馬。本→台、東南ア、濠。〔北村原色合弁425〕

423. *D. Yatabeana* Makino ミストラノオ 多年草、花穂は太く、花糸には長毛がある、Ⅷ—Ⅹ、〔京〕向島、河原林、中六人部村、羽束師。本→九、朝。〔牧野図鑑491、北村原色合弁424〕

424. *Flesholtzia* Argyi Lév. var. *nipponica* (Ohwi) Murata フトボナギナタコウジュ 葉は広卵形、苞は扇形、Ⅸ—Ⅹ、〔京〕貴船 (Type)、花背峠、〔大〕葛城山、〔奈〕川上村、〔兵〕粟鹿峰。本、九。〔北村原色合弁427〕

425. *E. ciliata* (Thunb.) Hylander ナギナタコウジュ 葉は長卵形、苞は卵状扁円形、Ⅸ—Ⅹ、〔京〕花園、菩提滝、大文字山、花背、比叡山、〔滋〕伊吹山、山中越、大津、〔三〕阿波村、御在所山、四日市、〔奈〕多武峯、高見山、〔兵〕鮎原村。北→台、アジア、ロシア。〔牧野図鑑493、北村原色合弁426〕

426. *Galeopsis bifida* Boenn. チシマオドリコソウ Ⅷ—Ⅹ、〔三〕大泊(婦化)。〔牧野図鑑524図、北村原色合弁453〕

427. *Glechoma hederacea* L. subsp. *grandis* (A. Gray) Hara カキドオシ 花の大きい株と小さい株

とあり、Ⅳ—Ⅴ、〔京〕岡崎、御室、山斜、頭巾山、成相山、〔大〕加賀田村、箕面、〔兵〕西宮、〔三〕朝熊山、治田村、〔和〕高野山、〔滋〕伊吹山、十禅師。北→台、東亜、シベリア。〔牧野図鑑532、北村原色合弁439〕

428. *Isodon inflexus* (Thunb.) Kudo ヤマハッカ
花は長さ8—10mm、上唇に濃紫点あり、Ⅸ—Ⅹ、〔京〕山中越、修学院、比叡山、質美村、〔兵〕六甲山、千種村、赤穂、雪彦山、〔大〕盤手村、〔滋〕伊吹山、²⁶⁾今津、〔奈〕川上村、三ッ茶屋、大峯山、〔和〕紀見村。北→九、朝、満、支。〔牧野図鑑485図、北村原色合弁402〕

429. *I. japonicus* (Burm.) Hara ヒキオコシ 花は淡紫色で長さ5—7mm、上唇濃紫点あり、がくは等しく5裂、Ⅸ—Ⅹ、〔京〕貴船、嵐山、市原、保津峡、君尾山、西大浦村、〔大〕箕面、〔兵〕六甲山、千種村、〔滋〕伊吹村、〔奈〕龍門山、白川渡、〔三〕神志山村、木本、〔和〕高野山。北→九、朝。〔牧野図鑑487、北村原色合弁402〕

430. *I. longitubus* (Miq.) Kudo アキチョウジ 花は長さ約2cm、がく齒は鈍頭、Ⅷ—Ⅹ、〔京〕比叡山、大悲山、鞍馬、海印寺、愛宕山、大江山、三岳山、西別院、長老岳、〔大〕葛城山、金剛山、尺代、〔滋〕横川、三國山、〔兵〕雪彦山、六甲山、来日岳、小川村、〔奈〕白川渡、大迫、多武峯、〔和〕高野山、富里村、三尾川、〔三〕尾鷲、靈山、阿波村、内宮、朝熊山。本(岐阜県以西)→九。〔牧野図鑑486、北村原色合弁403〕
f. *albiflorus* (Makino) Hara 〔和〕高野山。

431. *I. shikokianus* (Makino) Hara var. *intermedius* (Kudo) Murata タカクマヒキオコシ コアキチョウジ 葉は巾1.5—4cm、花は8—11mm、Ⅷ—Ⅹ、〔和〕豊原村、那智、三川村、〔三〕八鬼山、大台ヶ原、〔奈〕弥山、大峯山。本(関東以西)→九、表日本。〔北村原色合弁407〕

var. *occidentalis* Murata サンインヒキオコシ 葉はやや巾広く、花は長さ12—17mm、〔滋〕横川 (Type) 油日岳、〔京〕比叡山、大悲山、長老ヶ岳、知井村、〔兵〕九斗山、氷ノ山、畑ヶ平国有林、音水国有林、千種村、〔奈〕大峯山、〔三〕野登山、御在所山。本、九、裏日本。

432. *I. trichocarpus* (Maxim.) Kudo クロバナヒキオコシ 花は濃紫色小形、果実是有毛、Ⅷ—Ⅹ、〔京〕貴船、芹生、大悲山、雲ヶ畑、比叡山、花背峠、大原、君尾山、芦生、三岳、〔滋〕伊吹山、今津。本(裏

註 24) *C. tajimensis* Makino タジマミカエリソウはミカエリソウの葉の少し細い極端なものであって、区別する必要はないと考える。

25) 八頭献一:植物学雑誌31:200 (1956) による。

26) 伊吹山頂には特に毛深い型がある。

- 日本山地)、北。〔牧野図鑑3343図、北村原色合弁400〕
433. *Keiskea japonica* Miq. シモバシラ IX—X、(和)奇絶峡、和深、上秋津村。本(関東以西)→九。〔牧野図鑑492図、北村原色合弁398〕
434. *Lamium album* L. var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav. オドリコソウ IV—VI、(京)銀閣寺、上賀茂、花園、鹿ヶ谷、菩提滝、(三)藤原岳、(奈)吉野、(兵)粟鹿峯。日本全土、東亜。〔牧野図鑑525図、北村原色合弁445〕
435. *L. ambiguum* (Makino) Ohwi = *Loxocalyx ambiguus* Makino マネキグサ VII—IX、(京)貴船、深見峠、(滋)綿向山、西大路村、(大)金剛山、(三)矢頭山、深山園有林、野登山、平倉山、(和)八幡村、(奈)竜門山。本(神奈川県以西)→九。
436. *L. amplexicaule* L. ホトケノザ IV—VI、(京)下鴨、北白川、花園、(滋)十禅寺、大津。各地島や路傍に普通。本→台、欧亜大陸、アフリカ。〔牧野図鑑526図、北村原色合弁444〕
437. *L. humile* (Miq.) Maxim. = *Ajugoides hnmilis* (Miq.) Makino ヤマオウ VII、多く閉鎖花をつける、(和)千尋峠、野高山、大崎峠、(三)熊野、深山園有林、(奈)玉置山、天川村、尾鷲、川上村、笠拾山、柏木。本(神奈川県以西)→九。〔牧野図鑑518、北村原色合弁448〕
438. *L. purpureum* L. ヒメオドリコソウ IV—VI、(兵)神戸。ヨーロッパ原産帰化。〔奥山野外1: Pl. 17—3〕
439. *Leonurus macranthus* Maxim. キセワタ 葉は卵形、花は長さ25—32mm、VII—IX、(京)大河原村、尾占山、(兵)神楽村。北→九、満、支。〔牧野図鑑524、北村原色合弁443〕
440. *L. sibiricus* L. メハジキ 葉は分裂、花は長さ10—13mm、VII—IX、(京)京都、貴船、船岡山、(滋)大津、(大)天王寺、(奈)伯母谷、入ノ波、(和)和歌山、(兵)船越山。本→台、朝、満、支。〔牧野図鑑522図、北村原色合弁442〕
441. *Lycopus lucidus* Turcz. シロネ 茎は太く、葉は巾1.5—4cm、鋭きよ歯、VII—X、(京)修学院、湊村、鶴岡、(兵)千ヶ峯、(大)十三。湿地生。日本全土、東亜、北米。〔牧野図鑑502、北村原色合弁421〕
442. *L. Maackianus* (Maxim.) Makino ヒメシロネ やや細く、葉は巾5—15mm、鋭きよ歯、下部のものは往々欠刻様となる、VII—X、(京)山中越、松ヶ崎、上賀茂、質美村、須知、上六部人村、(滋)坂本、(和)貫志村、(三)上津村、神志山村。北→九、朝、満、東シベリア。〔牧野図鑑505図、北村原色合弁422〕
443. *L. ramosissimus* Makino ヒメサルダヒコ 茎は斜上し分枝多数、きよ歯は鈍頭、VII—IX、(京)向島、桂川、五箇村、(滋)平田村、(兵)竹田村、(和)高野山。本→九。〔牧野図鑑504図〕
- var. *japonicus* (Matsum. et Kudo) Kitam. コシネロ イヌシロネ 分枝少く、立ち上がる、(京)向島、芦生、久美浜、君尾山、(滋)東草野村、(大)大阪、(三)木本、金生水、(兵)神津村、生野(和)高野山。北→九、朝、満、支。〔北村原色合弁420〕
444. *Meehania montis-koyae* Ohwi オチフジ 走出枝は地下をはい、カメムシ様匂あり、V、(和)高野山(Type)、(兵)船越山。本。
445. *M. urticifolia* (Miq.) Makino ラショウモンカズラ 走出枝は地上、よい香気あり、IV—V、(京)静原、高雄、比叡山、芦生、古屋岡、(滋)東小椋村、政所、(奈)高見村、室生、(大)妙見山、(三)御池岳、(兵)船越山。本→九、朝、満。〔牧野図鑑533図、北村原色合弁466〕
- f. *leucantha* Hara シロバナラショウモンカズラ (京)早稲谷(綾部市)。
446. *Mentha arvensis* L. subsp. *haplocalyx* Briq. var. *piperascens* Malinv. ハッカ 花序は腋生、VII—X、(京)向島、六地蔵、五箇村。湿地生。北→九、東亜、シベリア。〔牧野図鑑500図、北村原色合弁431〕
447. *M. japonica* (Miq.) Makino ヒメハッカ 葉は小形全縁、VII—X、(和)那智、朝来婦。湿地生、稀。北、本。〔牧野図鑑501図、北村原色合弁432〕
448. *M. piperita* L. セイヨウハッカ 花序は頂生、VII—IX、(兵)神戸、曾根、(京)加茂町、(滋)神昭村、野洲。帰化。〔久内帰化植物92図〕
449. *Mosla dianthera* (Hamilt.) Maxim. ヒメジソ がく歯は鈍頭、IX—X、(京)山斜、修学院、上賀茂、愛宕山、山中越、比叡山、質美村、五十河村、(滋)西庄村、鎌掛、三井寺、今津、(大)尺代、信太山、高安、(兵)有馬、山本、粟鹿山、朝来町、吉見村、(和)高野山、(奈)春日山、川上村、(三)朝熊山、神川。日本全土、東亜、フィリピン、スマトラ、印。〔牧野図鑑496、北村原色合弁416〕
450. *M. hirta* Hara シラゲヒメジソ ヒカゲヒメジソ 葉はがくと共に毛あり、IX—X、(京)百井、花背峠、修学院、松ヶ崎、醍醐、(滋)飯道山。やや稀。本→台、朝。
451. *M. japonica* (Benth.) Maxim. ヤマジソ 苞は大形卵形、IX—X、(兵)六甲山、(大)葛城山、(滋)田上山、(三)国東山。やや稀。日本全土、朝。〔牧野図鑑495、北村原色合弁418〕
452. *M. punctulata* (J. F. Gmel.) Nakai イヌコウ

ジュ 鋸歯低く、かく歯は鋭頭、Ⅸ—Ⅹ、〔京〕向島、嵐山、愛宕山、比叡山、北白川、君尾山、〔兵〕篠山、山本、六甲山、〔大〕私市、〔滋〕田上山、〔奈〕高見山、〔和〕和歌山。北→台、朝、満、支。〔牧野図鑑497図、北村原色合弁417〕

453. *Perilla frutescens* (L.) Britt. エゴマ かくは果時1cmに達し、分果は径約2mm、Ⅶ—Ⅹ、〔奈〕多武峯、〔兵〕宝塚、〔大〕私市。東南アジア原産帰化。〔牧野図鑑499図〕

var. *citriodora* (Makino) Ohwi レモンエゴマ かくは果時6—7mm、分果は径1.2—1.5mm、〔京〕上賀茂、ボンボン山、嵐山、貴船、〔滋〕伊吹村、〔奈〕春日山、〔兵〕鮎原村、〔和〕北富田村。本→九。〔北村原色合弁423〕

var. *hirtella* (Nakai) Makino トラノオジツ 葉面長毛あり、花穂長し、〔和〕友ヶ島。稀。本、四、中。

454. *Perillula reptans* Maxim. スズコウジュ 地下茎は塊状にふくらむ、Ⅶ—Ⅹ、〔三〕外宮、朝熊山、〔和〕大雲取山、秋津川村、那智、近野村。本（愛知県以西）→九、琉。〔牧野図鑑494図、北村原色合弁399〕

455. *Prunella vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) Hara ウツボゲサ Ⅵ—Ⅶ、〔京〕愛宕山、大原、八木、〔滋〕多賀町、比良山、〔兵〕六甲山、鎧岳、〔奈〕室生、〔三〕木本。北→台、東亜、シベリア。〔牧野図鑑529図、北村原色合弁449〕

456. *Salvia glabrescens* (Fr. et Sav.) Makino アキギリ 花は紅紫色、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕大悲山、芦生、大河原村、大江町、五十河村、〔滋〕三国山、飯道寺山、城山国有林、西庄村、〔奈〕滝門村、玉置山、洞川、〔大〕金剛山、〔三〕霊山、阿波村。本（中部—近畿）。〔北村原色合弁409〕

457. *S. isensis* Nakai シマジタムラソウ 葉は厚く葉柄及び茎に開出毛多し、Ⅶ—Ⅷ、〔三〕朝熊山 (Type)、萱島。蛇紋岩地に生える。本（静岡県—三重県）。〔北村原色合弁414〕

458. *S. japonica* Thunb. アキノタムラソウ 花筒の

毛輪は基部近くにある。Ⅶ—Ⅹ、〔京〕比叡山、山中越、嵐山、大文字山、愛宕山、小野郷、山国村、西別院、下山、甘南備山、〔滋〕途中、彦根、多羅尾村、日本コバ、〔兵〕雪彦山、石ノ宝殿、三室山、船越山、医王山、姫路、有年、古市村、猪鼻谷、〔奈〕春日山、玉置山、笠捨山、金剛山、高野山、宇賀志村、〔和〕湯ノ峯、〔三〕須賀利村、朝熊山、湯ノ山、野登山。本→台、朝、支。〔牧野図鑑513図、北村原色合弁413〕

459. *S. lutescens* Koidz. ウスギナツノタムラソウ 花は淡黄色、Ⅶ—Ⅷ、〔三〕御在所山 (Type)、上津村、野登山、深山国有林、鈴鹿峠、〔滋〕大原村、綿向山。稀。特産。

var. *crenata* (Makino) Murata ミヤマタムラソウ 花は淡藍紫色、〔京〕半国山。²⁷⁾ 本（近畿以北）。

var. *intermedia* (Makino) Murata ナツノタムランウ 花は濃紫色、〔京〕比叡山、大原、貴船、鷹ヶ峯、〔滋〕途中、伊吹山、〔大〕永沢寺、犬鳴山、〔和〕瀨八丁、黒沢山、〔奈〕山上岳、国見岳、入ノ波。本（近畿→神奈川県）。〔牧野図鑑512図、北村原色合弁415〕

f. *albiflora* Murata シロバナナツノタムラソウ 〔和〕瀨八丁 (Type)

460. *S. nipponica* Miq. キバナアキギリ Ⅶ—Ⅹ、〔京〕下野久野、三岳山。当地方には稀。本、四、九。〔牧野図鑑514図〕

461. *S. omerocalyx* Hayata タジマタムラソウ かく内は一面に細毛あるのみ、Ⅴ—Ⅶ、〔兵〕八田村 (Type) 関ノ宮、小代村、〔京〕成相山、金剛童子山、弥栄村。特産。〔北村原色合弁411〕

462. *S. plebeia* R. Br. ミソコウジュ 越年草、Ⅴ—Ⅶ、〔京〕向島、紫野、〔和〕岩出、和歌山。本→台、東亜、印、濠。〔牧野図鑑510図、北村原色合弁410〕

463. *S. Ranzaniana* Makino ハルノタムランウ 花はほとんど白色、Ⅳ—Ⅶ、〔和〕北山村、瀨八丁、那智、〔三〕大杉谷、尾鷲、須賀利村、南輪内村、魚飛。本（紀伊半島）、四、九。〔牧野図鑑511図、北村原色合弁412〕

註 27) 竹内敏氏が採集し花明山植物園に栽培した標本を見た。