

近畿地方植物誌 (7)

村 田 源

464. *Scutellaria amabilis* Hara ヤマジノタツナミソウ 茎には上向きの短毛がある、V—VI、〔三〕上野 (Type)。本(静岡県、三重県)。
465. *S. brachyspica* Nakai et Hara オカタツナミソウ 茎の毛はちじれて下向、花穂は短い、V—VI、〔京〕嵐山、比叡山、雲ヶ畑、善峰寺、福知山、大江町、峰山、〔大〕金剛山、箕面、〔滋〕長命寺、伊吹山、〔奈〕春日山、三輪、〔和〕高野山、〔兵〕船越山。本、四。〔北原色合弁459〕
466. *S. dependens* Maxim. ヒメナミキ 花は腋生、VI—VIII、〔京〕向島。北→九、朝、満、シベリア。〔牧野図鑑542図、北村原色合弁465〕
467. *S. Guilielmi* A. Gray コナミキ 海岸近くにも生え花は白色腋生、V、〔和〕田辺、網不知、江住、〔兵〕生島。本(千葉県以西)→琉。〔北村原色合弁464〕
468. *S. indica* L. タツナミソウ V—VI、〔京〕鞍馬、旭村、大江町、〔兵〕八鹿、前山村、生郷村、香島村、〔大〕私市、〔滋〕島村、膳所、篠原、〔和〕高野山。本→台、支、印支。〔牧野図鑑538図、北村原色合弁460〕
var. *parvifolia* Makino コバナタツナミ、ピロウドタツナミ 全体小形、葉は長さ1cm内外、V—VI、〔京〕善峯寺、御室、〔奈〕春日山、〔滋〕十禅師、上山田、鎌掛村、西大路村、〔兵〕赤穂、船越山、由良町、〔和〕串本、江住、東富田村、黒島、〔三〕管島、須賀利村、朝熊山、鳥羽、尾鷲、神島。本(伊豆半島)→九。
469. *S. laeteviolacea* Koidz. シソバタツナミ 茎にはやや上に曲がつた毛があり、葉は光沢があり下面帯紫色、がくに腺点あり、V—VI、〔兵〕六甲山、船越山、〔京〕半国山。本(福島県以西)→九。〔牧野図鑑539図、北村原色合弁456〕
470. *S. Maekawae* Hara²⁸⁾ホナガタツナミ²⁹⁾ 前種に似るが、茎の毛は開出して下向、葉は生時つやがなく裏は紫色を帯び、がくにはほとんど腺点がない、V—VI、〔京〕比叡山、愛宕山、上賀茂、海印寺、亀岡、〔滋〕石山、比良山、篠原、伊香具村、〔大〕葛城山、〔奈〕春日山、上北山村、〔三〕船津村 (Type) 赤目、飛鳥村、大杉谷、尾鷲、御在所山、〔和〕高野山。本(福島県以西)。〔植研12巻798、北村原色合弁457〕
var. *Kurokawae* (Hara) Murata イガタツナミソウ 葉は円く小形、茎は細長く伸び開出毛あり、V—VI、〔三〕箕曲村 (Type)、尾鷲、〔京〕上賀茂、〔兵〕六甲山。本(福島県以西)→四。〔北村原色合弁458〕
471. *S. Muramatsui* Hara デウノタツナミソウ 走出枚を出す、V—VI、〔京〕芦生、〔滋〕湯山越、釈迦岳。本(近畿以北)。〔植研12巻800〕
471. *S. pekinensis* Maxim. var. *transitra* (Makino) Hara ヤマタツナミソウ 花筒は斜上する、V—VI、〔京〕八瀬、〔大〕妙見山、川久保。本→九、朝。〔牧野図鑑540図、北村原色合弁462〕
var. *ussurieensis* (Regel) Hand.-Mzt. エゾタツナミソウ 葉はうすくほとんど無毛、V—VI、〔滋〕伊吹山、川上村、三国山(高島郡)、〔三〕御在所山。本(近畿以北)→北、朝、満、シベリア。
472. *S. shikokiana* Makino ミヤマナミキ VII—VIII、〔和〕八幡村、那智山、〔三〕深山国有林、大台ヶ原、川又、上津村、大杉村、新鹿町、〔奈〕下北山村、〔兵〕雪彦山。本(関東以西)→九。〔北村原色合弁463〕
473. *S. strigillosa* Hemsl. ナミキソウ 海岸生、VII—VIII、〔京〕竹野郡、湊村、〔大〕堺、〔三〕米津浦。北→九、朝、満、千、樺。〔牧野図鑑541図、北村原色合弁454〕
474. *Stachys Riederi* Cham. var. *intermedia* (Kudo) Kitam. イヌゴマ 茎に逆刺あり、VII—VIII、〔京〕向日町、神足、八木町、大江山、〔三〕阿波村、〔奈〕洞川、〔和〕山崎村。〔牧野図鑑520図、北村原色合弁430〕
var. *villosa* (Kudo) Kitam. エゾイヌゴマ²⁹⁾ 茎に開出粗毛あり、〔京〕大山崎、〔滋〕瀬田。本(中部地方以北)→千、樺。
475. *Teucrium japonicum* Houtt. ニガクサ がく歯は鋭頭、果時にも口はすばまない、VII—IX、〔京〕宇治田原、高雄、八木町、嵐山、〔滋〕水口、北比都佐村、西大路村、〔奈〕宇賀志村、〔兵〕雪彦山、妙見山、〔和〕新宮、〔三〕尾鷲、井戸町、野登山。北→

註 28) シマジタツナミソウ var. *pubescens* Hara は毛の多少は変異が多く変種としてみとめられないと思う。

註 29) 道路工事の芝について移入したものと思われる。

- 琉、朝。〔牧野図鑑545図、北村原色合弁476〕
476. *T. viscidum* Blume var. *Miquelianum* (Maxim.) Hara ツルニガクサ がくは腺毛が多く上裂片は鈍頭、果時に口がすぼむ、Ⅶ—Ⅸ、〔京〕比叡山、愛宕山、貴船、花背峠、〔大〕箕面、〔兵〕雪彦山、船越山、八千代村、〔奈〕玉置山、〔和〕那智、前鬼、九鬼。北→台、朝。〔北村原色合弁475〕
477. *Thymus serpyllum* L. subsp. *quinquecostatus* (Celak.) Kitam. イブキジャコウソウ 山や海岸の向陽地生、Ⅵ—Ⅶ、〔京〕青葉山、〔滋〕伊吹山、〔三〕菅島。北→九、朝、満、支、ヒマラヤ、アフガニスタン(ヌリスタン)。
- f. *albiflorus* Tatew. シロバナイブキジャコウソウ 〔滋〕伊吹山。

19 Verdenaceae クマツズラ科

478. *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch コムラサキ葉は3—6cm、花序は葉腋より上にはなれて出る、Ⅶ—Ⅷ、〔大〕新家村、〔和〕新宮、大島、〔京〕大江山。本→台、朝、支。〔牧野図鑑561図〕
479. *C. japonica* Thunb. ムラサキシキブ³⁰⁾ 花序は葉腋に接し葉脈は5—9対、Ⅵ—Ⅷ、〔京〕比叡山、南禅寺、花背峠、愛宕山、大江山、〔大〕妙見山、〔滋〕伊吹山、彦根、市辺村、〔兵〕有馬、小金岳、〔和〕和歌山、日高、三尾村、〔三〕大杉谷、野登山、菅島。北(南部)→台、朝、満、支。〔牧野図鑑560図〕
- var. *luxurians* Rehder オオムラサキシキブ 葉は長さ10—15cm、やや厚く海岸生、〔和〕黒島、〔兵〕余部。本→台、朝。〔中井樹木誌 ed. 2 : p. 454〕
480. *C. kochiana* Makino ヒロウドムラサキ 葉枝共に密に毛がある、Ⅷ、〔三〕須賀利村、桂城村。本(紀伊半島)→台、支、印支。〔中井樹木誌 ed. 2 : p. 459〕
481. *C. mollis* Sieb. et Zucc. ヤブムラサキ 葉は有毛、Ⅵ—Ⅶ、〔京〕愛宕山、東山、比叡山、〔滋〕比良山、多賀村、〔兵〕来日岳、船越山、八千代村、伊佐村、〔和〕大雲取山、和歌山、瀨峡、〔三〕大杉谷、菅島、野登山。本(中部以西)→九、朝。〔牧野図鑑562図〕
482. *C. shirasawana* Makino イヌムラサキシキブ (ムラサキシキブ×ヤブムラサキ) ムラサキシキブより葉にわずかに毛が多い、Ⅵ—Ⅶ、〔京〕雲ヶ畑、

- 吉田山、〔大〕金剛山。本、朝。〔中井樹木誌 ed. 2 : p. 462〕
483. *Caryopteris divaricata* (Sieb. et Zucc.) Maxim. カリガネソウ Ⅷ—Ⅸ、〔滋〕西大路村、〔兵〕船越山、猪鼻谷(淡)、〔奈〕春日山、〔和〕北富田村。北→九、朝、支。〔牧野図鑑553図、北村原色合弁479〕
484. *Clerodendrum trichotomum* Thunb. クサギ Ⅷ—Ⅸ、〔京〕田中、深泥池、〔和〕尾鷲、〔大〕堺、山本。北→台、朝、満、支。〔牧野図鑑556図〕
- f. *ferrugineum* (Nakai) Ohwi ヒロウドクサギ 葉裏密に毛あり、〔京〕比叡山、〔滋〕西大路村。本朝、満。
485. *Lippia nodiflora* (L.) L. C. Rich. イワダレソウ Ⅶ—Ⅸ、〔和〕串本、潮岬、大島。本(関東以西)→台、汎熱帯。〔牧野図鑑565図、北村原色合弁480〕
486. *Premna japonica* Miq. ハマクサギ Ⅴ—Ⅶ、〔和〕東富田村、〔三〕朝熊山。本(近畿以西)→台。〔牧野図鑑555図〕
487. *Verbena officinalis* L. クマツズラ Ⅵ—Ⅸ、〔京〕大原、〔兵〕石ノ宝殿、西志方村、生島、〔大〕大阪、〔三〕野登山、〔和〕和歌山。本→台、欧、北アフリカ。〔牧野図鑑563図、北村原色合弁481〕
488. *Vitex rotundifolia* L. f. ハマゴウ 海岸生、Ⅶ—Ⅸ、〔滋〕中洲村、〔京〕湊村、宮津、〔兵〕生島、松帆村、〔和〕白浜、潮岬、玉置口村、宮井、和歌山、〔三〕須賀利村。本→台、小、朝、東南亜、太平洋、濠。〔牧野図鑑558図〕

20 Boraginaceae ムラサキ科

489. *Ancistrocarya japonica* Maxim. サウルリソウ Ⅴ—Ⅶ、〔兵〕段ヶ峯、〔京〕長老岳、〔奈〕室生、大塔山、行者還岳、天川村、大峯山、〔和〕白口峰。本(中部以西)→九。〔牧野図鑑572図、北村原色合弁482〕
490. *Bothriospermum tenellum* (Hornem.) Fisch. et Mey. ハナイバナ 花序に葉状苞がある、Ⅲ—Ⅻ、〔京〕大山崎、八木町、〔大〕豊中、堺、山本、箕面、〔和〕栗栖川村、〔三〕木本、〔滋〕十禅師、今津。北→台、朝、東南アジア。〔牧野図鑑579図、北村原色合弁494〕
491. *Cynoglossum asperrium* Nakai オニルリソウ 茎は開出長粗毛あり、Ⅵ—Ⅷ、〔京〕高雄、鷲峯

註 30) 葉形変異多く、細長くて長さが巾の7—10位になるものを f. *angustata* (Rehder) Ohwi ナガバムラサキ〔兵〕八千代村(清水4454)、〔三〕野登山(清水4041)。又葉が極小形で長さ3—4cmのものをコバムラサキシキブ f. *Taquetii* (Lév.) Ohwi〔兵〕小金岳(田代)等があるが、中間形があつてはつきり区別は困難である。

- 山、嵐山、貴船、〔兵〕三室山、千種村、葛野村、段ヶ峰、音水国有林、〔滋〕伊吹山、藤原岳、〔奈〕入ノ波、川上村、前鬼、柏木、〔和〕古座、〔三〕飛鳥村。北→九、朝。〔北村原色合弁495〕
492. *C. zeylanicum* (Vahl) Thunb. オオルリソウ³¹⁾
茎は短圧毛又はやや斜開短毛を密生する。Ⅶ—Ⅷ、〔京〕雲ヶ畑、〔大〕金剛山、〔兵〕味間村、雪彦山、〔奏〕柏木、〔和〕東富田村、稲成村、〔三〕尾鷲、野登山、椿村。本→九、台、東南アジア、印。〔牧野図鑑581図〕
493. *Ehretia Dicksoni* Hance var. *japonica* Nakai
マルバチシヤノキ 葉は圧剛毛があつてざらつく、Ⅴ—Ⅶ、〔和〕潮岬、東富田村、那智。本(千葉県以西)→台、支。〔牧野図鑑586図〕
494. *Lithospermum arvense* L. イヌムラサキ Ⅳ—Ⅶ、〔滋〕大津東浦。ごく稀。本→九、欧亜、北米。〔牧野図鑑574図、北村原色合弁485〕
495. *L. erythrorhizon* Sieb. et Zucc. ムラサキ³²⁾
北→九、朝、満、支、アムール。〔牧野図鑑573図、北村原色合弁486〕
496. *L. Zollingeri* A. DC. ホタルカズラ Ⅳ—Ⅴ、〔滋〕伊吹山、霊仙山、鳥居本村、〔兵〕布引滝、広石村、〔大〕箕面、葛城山、〔奈〕金剛山、〔和〕番所崎、西谷村、有井村。北→台、朝、支。〔牧野図鑑575図、北村原色合弁484〕
497. *Messerschmidia sibirica* L. スナビキソウ³³⁾
北→九、アジア、ロシア。海岸生。〔牧野図鑑584図、北村原色合弁496〕
498. *Omphalodes japonica* (Thunb.) Maxim. ヤマルリソウ Ⅳ—Ⅴ、〔京〕鞍馬山、芦生、比叡山、大悲山、綾部、大江町、〔大〕天見村、〔滋〕伊吹山、比良山、十禅師、〔奈〕宇賀志村、金剛山、〔和〕高野山、〔三〕柘植、藤原岳、鎌ヶ岳。本→九。〔牧野図鑑583図、北村原色合弁492〕
499. *Trigonotis brevipes* (Maxim.) Maxim. ミズタバコ Ⅴ—Ⅶ、〔京〕鞍馬、大文字山、大悲山、知井村、黒田村、長老岳、大江山、〔滋〕比叡山、比良山、大津、西庄村、伊吹山、〔兵〕雪彦山、小金岳、〔奈〕山上岳、〔和〕高野山、〔三〕滝川村。本→九。〔牧野図鑑569図、北村原色合弁487〕
var. *coronata* (Ohwi) Ohwi コシジタバコ

果実の背に環状体あり、〔京〕鴨川。

500. *T. peduncularis* (Trevir.) Benth. キウリグサ Ⅲ—Ⅴ、〔京〕比叡山、北白川、上賀茂、鞍馬、向島、八木、綾部、〔大〕箕面、堺、〔兵〕六甲山、〔滋〕北比都佐村、〔和〕西富田村、〔奈〕宇賀志村。北→琉、アジア。〔牧野図鑑568図、北村原色合弁488〕

21 Convolvulaceae ヒルガオ科

501. *Calystegia hederacea* Wall. コヒルガオ 葉の側裂片は横に開出、Ⅵ—Ⅷ、〔京〕京都、〔滋〕大津、〔兵〕朝来町。本→九、東南アジア。〔牧野図鑑599図、北村原色合弁505〕
502. *C. japonica* Choisy ヒルガオ Ⅶ—Ⅷ、〔京〕桂川堤、向島、八木、知井村、〔滋〕北比都佐村、〔和〕高野山、三栖、〔三〕神路山村。北→九、朝、満、支。〔牧野図鑑598図、北村原色合弁506〕
f. *albiflora* (Makino) Hara シロバナヒルガオ 〔和〕高野山。
503. *C. sepium* (L.) R. Br. ヒロハヒルガオ 葉は三角状、花はほとんど白色に近い、Ⅶ—Ⅷ、〔京〕貴船、鞍馬、市原、花背、稻荷、芦生、大江山、〔兵〕妙高山、外野、粟鹿山、赤西国有林、神楽村、芦田村。北→本、世界温帯。〔北村原色合弁507〕
504. *C. soldanella* (L.) Roem. et Schult. ハマヒルガオ 海岸生、Ⅴ—Ⅶ、〔兵〕都志町、〔大〕二色ノ浜、〔和〕江住、〔三〕四日市、須賀利村。北→九、アジア、ヨーロッパ、大洋州、アメリカ太平洋側。〔牧野図鑑600図、北村原色合弁504〕
505. *Convolvulus arvensis* L. セイヨウヒルガオ Ⅴ—Ⅹ、〔京〕八木、〔大〕堺、〔三〕四日市。帰化。
506. *Cuscuta australis* R. Br. マメダオシ 花柱は2、花冠はさくより短い、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕伏見、巨椋、八幡、〔大〕高槻、岸和田、金剛山麓、川久保、〔滋〕南郷、〔兵〕武庫川尻、〔和〕江住。北→台、支、東南アジア、オーストラリア。〔北村原色合弁500、牧野図鑑590図〕
507. *C. chinensis* Lam. ハマネナシカズラ 花柱は2、花冠はさくより長い、Ⅵ—Ⅹ、〔兵〕吹上浜、〔大〕高師浜、石津海岸、〔和〕田辺、中浜。本→台支。東南アジア、オーストラリア。〔牧野図鑑592図、

註 31) var. *villosulum* (Nakai) Ohwi は短毛の斜開する形をいうが、はつきり区別はできないようである。大井博士の日本植物誌では本州のものはこの形となつてゐるが、当地方にも圧毛のみの個体も産する。

註 32) 宇井：紀州植物誌 p. 47 (1929)、岡本：大和植物誌 p. 98 (1937)、田代・堀：大阪府植物誌 p. 47 (1938)、井上：兵庫県植物目録(和名篇) p. 36 (1953)、上野高校：伊賀地方植物目録等に記録があるが、未だ標本を見ず。

33) 宇井：紀州植物誌 p. 71 (1929)、伊藤：三重県植物誌 p. 610 (1932)、井上：兵庫県植物目録(和名篇) p. 36 (1953) 等に記録あり、未だ標本をたしかめ得ず。

北村原色合弁65図3)

508. *C. japonica* Choisy **ネナシカズラ** 花柱は1、
Ⅷ—Ⅹ、〔京〕淀、上賀茂、〔大〕山本、箕面、高槻、〔奈〕入ノ波、〔兵〕小金岳、船越山、猪鼻谷、
〔滋〕十禅師、〔和〕大島。北→琉、朝、満、支、ア
ムール。〔牧野図鑑591図、北村原色合弁499〕
509. *Dichondra repens* Forst. **アオイゴケ** Ⅳ—Ⅷ、
〔大〕泉南、〔和〕田辺、江住。本→台、熱帯。〔北
村原色合弁501〕
510. *Ipomoea hederacea* (L.) Jacq. **アメリカアサガ
オ** 〔奈〕二上村。帰化。
511. *I. lacunosa* L. **ヒメアサガオ** 〔滋〕石部、〔大〕
堺。帰化。
512. *I. pes-caprae* (L.) Sweet **ゲンバイヒルガオ**
〔兵〕竹野浜、〔和〕木本。当地方にては種子が流着
して生えるが、越冬定着せず。

22. Asclepiadaceae ガガイモ科

513. *Cynanchum ascyrifolium* (Fr. et Sav.) Mats-
um. **クサタチバナ** 花冠は白色無毛、葉は有柄、
Ⅵ—Ⅷ、〔滋〕伊吹山、〔奈〕行者還山、弥山、石灰
岩地に生える。本→四、朝、満。〔牧野図鑑616図、
北村原色合弁512〕
514. *C. atratum* Bunge **フナバラソウ** ロクエンソ
ウ 葉裏密軟毛あり、花は濃紫色、Ⅴ—Ⅶ、〔京〕間
人、〔三〕朝熊山、神田、木尾呂志村、〔和〕竜門
山。北→九、朝、満、支。〔牧野図鑑618図、北村原
色合弁511〕
515. *C. caudatum* (Miq.) Maxim. **イケマ** 花序は
葉柄より長い、Ⅶ—Ⅷ、〔兵〕篠山、生郷村、〔京〕
知井村、牛尾山、〔滋〕伊吹山、〔奈〕弥山、大峰山。
北→九、中、千。〔牧野図鑑612図、北村原色合弁508〕
516. *C. glabrum* Nakai **タチカモメヅル** クロバナカ
モメヅル、花は濃紫色径9mm、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕比叡
山、上賀茂、鷲峰山、下六人部村、〔滋〕小谷山、
三井寺、〔兵〕竹田町、淡路島、〔大〕信太村、新家
村、百舌鳥村、〔三〕島ヶ原、稻生、〔奈〕都邠村、
〔和〕池田村。本(近畿以西)→九、朝。〔北村原色
合弁514〕
f. *viridescens* Murata **アオタチカモメヅル** 花
は淡緑色、〔滋〕油山、〔三〕椋本村。
517. *C. grandifolium* Hemsl. var. *nikoense* (Maxim.)
Ohwi **ツルガシワ** 葉は大きく花柄はごく短い、
Ⅶ—Ⅷ、〔滋〕伊吹山、〔三〕野登山、霊仙。本、四。
〔北村原色合弁510、牧野図鑑620図〕
518. *C. japonicum* Morr. et Decne. **イヨカズラ** 花
は淡黄色、Ⅴ—Ⅶ、〔和〕澗八丁、白浜、和歌浦、

東富田村、玉置山、〔三〕木本、井戸、弁天島、鬼
ヶ城、〔大〕東鳥取村、〔兵〕猪鼻谷、沼島。本→九
朝、支。〔牧野図鑑614図、北村原色合弁513〕

f. *albiflorum* (Fr. et Sav.) Hara **シロバナクサ
タチバナ** 花は白色でやや大きい、〔三〕尾鷲、長
島。

var. *puncticulatum* (Koidz.) Hara **クロバナイ
ヨカズラ** 花は暗紫色、〔三〕生馬村。

519. *C. Katoi* Ohwi **クサナギオゴケ** 茎は直立し先
はつる状、花序は散開する、Ⅴ—Ⅶ、〔兵〕六甲山、
〔三〕石薬師村。本(東海—近畿) 〔北村原色合弁
516〕

520. *C. macranthum* (Maxim.) Nakai **シロバナカ
モメヅル**、オオバナカモメヅル 花冠は径13—20m
m、淡緑白色、Ⅷ、〔京〕五箇村。本(近畿以东)→
北。

var. *Dickinsii* (Fr. et Sav.) Ohwi **ハコネカモ
メヅル** 花は暗紫色、〔三〕日永村、四日市、〔滋〕
膳所。本(関東—近畿)。

521. *C. multinerve* (Fr. et Sav.) Matsum. **ホソバ
ノロクオンソウ** 花は帯白色、Ⅵ—Ⅶ、〔三〕安楽
島、〔和〕岩倉村、〔奈〕天神山。本。

522. *C. paniculatum* (Bunge) Kitagawa **スズサイ
コ** Ⅶ—Ⅷ、〔京〕田辺町、知井村、〔兵〕関ノ宮、
竹田村、〔奈〕桜井、室生、〔滋〕伊吹山、〔和〕和
歌山。北→九、満、朝、支、ダフリヤ。〔牧野図鑑
610図、北村原色合弁509〕

523. *C. subanceolatum* (Miq.) Matsum. **アズマカ
モメヅル** 花は淡黄白色径7—12mm、〔滋〕膳所、
小谷山、雄松崎、〔三〕四日市。本。

var. *obtusulum* (Fr. et Sav.) Matsum. **コバナ
カモメヅル** 花は暗紫色、Ⅶ—Ⅹ、〔大〕四条畷、
大阪、〔滋〕大溝町、〔三〕飯野村。本(関東—近畿)。

524. *C. Wilfordi* (Maxim.) Hemsl. **コイケマ** 花序
は葉柄より短い、Ⅶ—Ⅷ、〔京〕大悲山、五十河村、
〔兵〕外野、氷ノ山、〔滋〕伊吹山、〔大〕川久保。
本→九、朝、満。〔牧野図鑑613図〕

525. *Marsdenia tomentosa* Morr. et Decne. **キジ
ヨラン** Ⅷ—Ⅹ、〔兵〕船越山、八千代村、〔奈〕室
生、〔和〕由良。本(関東以西)→九、朝。〔牧野図
鑑608図、北村原色合弁520〕

526. *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino **ガガイ
モ** Ⅷ、〔京〕比叡山、吉田、〔滋〕伊吹山、〔兵〕
朝来町、〔大〕服部、〔和〕和歌山。北→九、朝、満、
支、千南部。〔牧野図鑑611図、北村原色合弁519〕