

近畿地方植物誌 11

村 田 源

748. *Ludwigia ovalis* Miq. ミズユキノシタ
湿地生ではう、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕向島、〔滋〕堅田、〔三〕稻生村、神戸、花ノ木村。本→台、朝、支。〔北村原色離弁81, 新牧野図鑑1699〕
749. *L. prostrata* Roxb. チョウジタデ
湿地生、直立。Ⅶ—Ⅹ、〔京〕上賀茂、稲荷、向島、胡麻、〔大〕信太山、堺、〔滋〕田上山、〔奈〕高見村、〔和〕大島。北→台、朝、満、支、東南ア。〔北村原色離弁82, 新牧野図鑑1698〕
750. *Oenothera biennis* L. メマツヨイグサ
Ⅶ—Ⅹ、果実は長さ2—3cm、〔大〕枚方市。北米原産帰化。少ない。
751. *O. erythrosepala* Borbas オオマツヨイグサ
Ⅶ—Ⅹ、花は径6—7cm、〔滋〕比良山麓、〔京〕北白川、淀川堤。北米原産帰化。〔北村原色離弁75, 新牧野図鑑1708〕
752. *O. laciniata* Hill. コマツヨイグサ
Ⅶ—Ⅹ、葉は羽状に切れ込む、〔兵〕姫路、高砂、大塩。的形、五色浜(淡)、神戸、〔大〕我孫子、浜寺、〔和〕和歌山、御坊大浜、〔三〕四日市。北米原産帰化。
753. *O. odorata* Jacq. マツヨイグサ
Ⅶ—Ⅹ、〔京〕下鴨、北白川、木津川畔、〔和〕竜門村、〔三〕小岐須。南米原産帰化。〔新牧野図鑑1707〕
754. *O. parviflora* L. アレチマツヨイグサ
Ⅶ—Ⅹ、〔兵〕有馬、〔京〕貴船、桂、〔滋〕近江舞子。ヨーロッパ原産帰化。〔久内帰化植物84図〕

42. Trapaceae ヒシ科

755. *Trapa bispinosa* Roxb. var. *linumai* Nakai ヒシ Ⅶ—Ⅹ、〔京〕向島、深泥池、〔大〕信太山、高安、山本、堺、〔滋〕水口町、彦根、貴生川、〔三〕神志山村。本。〔北村原色離弁84, 新牧野図鑑1678〕
756. *T. incisa* Sieb. et Zucc. ヒメヒシ やや小形で果実のトゲは4本、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕木幡、巨椋池、〔奈〕奈良。本→台、満。〔北村原色離弁83, 新牧野図鑑1690〕
757. *T. natans* L. var. *japonica* Nakai オニヒシ 大形で果実のトゲは4本、毛が多い、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕向島、〔滋〕彦根。本→台。〔新牧野図鑑1688〕

43. Melastomaceae ノボタン科

758. *Osbeckia chinensis* L. ヒメノボタン⁵⁵⁾
〔和〕新宮附近、高田、〔三〕御船。本(紀伊半島)→台、中、マレー、オーストラリア。〔北村原色離弁85, 新牧野図鑑1686〕

44. Alangiaceae ウリノキ科

759. *Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms var. *macrophyllum* (Sieb. et Zucc.) Wangerin ウリノキ Ⅶ、〔兵〕氷ノ山、船越山、音水国有林、但馬妙見山、粟鹿山、〔大〕金剛山、〔京〕貴船、黒田村、比叡山、知井村、鞍馬、〔滋〕伊吹山、西大路村、永源寺町、御池岳、米原町、〔奈〕弥山、行者還岳、川上村、洞川、〔三〕赤目、藤原岳、野登山、大又、〔和〕高野山。北→九、朝、満。〔新牧野図鑑1681〕

45. Lythraceae ミソハギ科

760. *Ammannia multiflora* Roxb. ヒメミソハギ 水田中に生える。Ⅶ—Ⅹ、〔兵〕養父市場村、朝来町、〔京〕久世村、八木町、〔滋〕神照村、伊吹、大溝町。本→東南ア、マレー、欧、アフリカ。〔北村原色離弁86, 新牧野図鑑1670〕
761. *Lythrum anceps* (Koehne) Makino ミソハギ Ⅶ、〔兵〕関宮村、朝来町、〔京〕青葉山、知井村、〔滋〕比叡山、木本町、比良山、〔和〕大島、和歌山、〔三〕神志山村。北→九、朝。〔北村原色離弁91, 新牧野図鑑1668〕
762. *L. Salicaria* L. エソミソハギ 花序や葉裏に毛状凸起が多い、Ⅶ—Ⅹ、〔京〕浜話村。樺→九、亜、欧、北アフリカ。〔新牧野図鑑1669〕
763. *Rotala indica* (Willd.) Koehne var. *uliginosa* (Miq.) Koehne キカシグサ Ⅶ—Ⅹ、〔京〕上賀茂、宇治、金井戸、八木町、園部町、田辺町、上六人部村、〔大〕豊中、信太村、〔奈〕松尾山、〔和〕大島、小口。北→台、満、アムール。〔北村原色離弁90, 新牧野図鑑1671〕
764. *R. leptopetala* Koehne var. *littorea* (Miq.) Koehne ミズキカシグサ Ⅶ—Ⅹ、〔京〕五十河村、〔和〕朝来村、〔三〕尾鷲。本(中)→琉、朝。〔北村原色

註55) 宇井縫三：紀州植物誌103(1929)による。
註56) 伊藤武夫：三重県植物誌による。

離弁89, 新牧野図鑑1672]

765. *R. pusilla* Tulasne ミズマツバ
Ⅶ—Ⅹ, [兵]養父郡中米地, [京]向島, 金井戸, 五十河村, [奈]松尾山。本(中)→東南ア, アフリカ。[北村原色離弁87, 新牧野図鑑1674]

46. Elaeagnaceae グミ科

766. *Elaeagnus Arakiana* Koidz. タンググミ
葉は丸く表面に褐色鱗毛が成葉まで残る。Ⅴ—Ⅶ, [京]大江山(Type), 蛇紋岩地特産。
767. *E. glabra* Thunb. ツルグミ
Ⅹ—Ⅺ, [兵]竹田, [京]比叡山, 鞍馬, 大原野, 篠村, 東大浦村, [大]槇尾村, 山本, 箕面, [滋]飯道寺山, 甲津畑, 三上村, 立木山, 比良山, 今津町, [奈]金剛山, 室生, [和]田辺町, 大島, 御坊, [三]鈴鹿峠, 御在所山, 床木。本(関東以西)→台, 朝, 支。
[新牧野図鑑1666]
768. *E. macrophylla* Thunb. オオバグミ マルバグミ 海岸生, Ⅹ—Ⅺ, [兵]余部, [京]湊村, 下宇川村, [和]白崎, 日御崎, [三]鳥羽, 菅島。本→台, 朝。[新牧野図鑑1667]
769. *E. × maritima* Koidz. アカバグミ オオバツルグミ ツルグミとオオバグミとの雑種, [京]西大浦村, 冠島。本→琉, 朝。
770. *E. montana* Makino マメグミ
葉は上面白鱗あり後脱落, 枝は褐鱗あり, 花梗は1—3cm, Ⅵ—Ⅶ, [滋]伊吹山, 御池岳, 綿向山, [三]藤原岳, 朝熊岳, [奈]行者還岳。本(関東以西)→九。
[新牧野図鑑1663]
771. *E. multiflora* Thunb. f. *pacifica* Araki カントウナツグミ⁵⁷⁾ ナツグミ葉の表面に鱗毛あり, 葉は長だ円形—だ円形, [三]神路山, 菟野山, 宇治山田, [和]大島, [奈]吉野, 三輪山, [大]千早村, 金剛山。本(太平洋側)。[新牧野図鑑1660]

var. *hortensis* (Maxim.) Serv. トウグミ⁵⁸⁾

葉は楕円形で表面星毛あり, Ⅳ—Ⅴ, 時に栽培される, [京]向島(栽), 海印寺, 芹生, 平屋村, 上六人部村, 須知, 静市野村, 花背, 貴船, 福知山, 宇治, 大原, [滋]仰木峠, 永源寺, 比叡山, 政所, 川上村, 石山, [大]河内村, 下河内, 葛城山麓(栽), [三]二見浦, 床木, 島路山。北→本(日本海側)。[新牧野図鑑1661]

f. *jucundicocca* (Koidz.) Araki ホソバサイグミ サイグミ 葉は細く両端鋭頭, [京]中六人部村, 旭村, 福知山, 知井村, [滋]永源寺町, 比良山, 鎌掛村, [三]具留孫山, [奈]三輪山。本(近畿)。

772. *E. Murakamiana* Makino アリマグミ
果実基部は嘴状になる, Ⅳ—Ⅴ, [兵]有馬, 山田村, 古市村, 八上村, 布施畑村, 洲本, [大]大土村, 大木, 山本, 新家村, [和]上岩出村, 池田村, 小倉村, 根来村, [三]御在所山, 湯ノ山。本(東海—近畿), 四。

773. *E. Numajiriana* Makino コウヤグミ
Ⅴ, [和]高野山, 護摩壇山, 八幡村, [大]金剛山, [三]大杉谷, 矢頭山, 川上。少ない。本(近畿)。[伊藤: 三重県植物誌上170図]

774. *E. × praematura* (Koidz.) Araki ワセアキグミ⁵⁹⁾ イズミグミ アリマグミとアキグミとの雑種, Ⅳ—Ⅴ, 7月に熟す, 葉面星毛あり, [大]山本, 山中溪, [京]旭村。

775. *E. pungens* Thunb. ナワシログミ⁶⁰⁾
Ⅹ—Ⅺ, [兵]八木村, 高平村, [京]比叡山, 西別院村, 嵐山, 大原野, 山中越, 竜ヶ岳, [滋]大津, 野州町, 伊吹村, [和]白浜町, 大島, 由良町, 田辺町, 本宮, 日御崎, 瀬戸鉛山, [大]高安, 高槻市, [三]鈴鹿峠, 加太, [奈]多武峰。本(中部以西)→九。

var. *Simonii* (Carr.) Nichols. マルバナワシログミ 葉は広く海岸生, トゲはあまり出ない, [和]本ノ脇, 江住村, 三輪崎。本→九。

註57) 近畿南部の太平洋側には葉の表面に白鱗毛をもつものがある。荒木氏はさらに葉の広い型を *f. elliptica* としているが, この間には中間形の方がむしろ多いぐらいで区別する必要はないと考える。筆者は白鱗毛をもつ var. *multiflora* の中を *f. multiflora* ホソバナツグミ, *f. orbiculata* (Makino) Araki マルバナツグミ, *f. pacifica* Araki (= *f. elliptica* Araki, *E. multiflora* var. *crispa* (Maxim.) Servettaz) カントウナツグミ, ヒロバナツグミの3品種をみとめたい。

註58) 葉面に星毛のあるものを var. *hortensis* としてまとめることは荒木氏の意見に賛成である。葉の長目のものを荒木氏は *f. oblongata* として区別しているが, この間には変異が連続して明らかでない。葉の狭長で両端とがるものだけをホソバサイグミ *f. jucundicocca* (Koidz.) Araki としてみとめたい。関東のホソバナツグミに対応する形である。

註59) *E. praematura* (Koidz.) Araki in *Hokuriku Journ. Bot.* Ⅳ: 107 (1955) = *E. crispa* var. *praematura* Koidz. in *Acta Phytotax. Geobot.* Ⅷ: 191 (1939)—Hara, *Enum. Sperm. Jap.* Ⅲ: 243 (1954). *E. tsudai* Makino, nom. nud. 堀, 大阪府植物誌261(1962)。

註60) 葉形は変化が多く若木や若枝のものは大きく, 枝のつんだ日当りのものは小形である。荒木氏は var. *latifolia*, var. *megaphylla*, var. *angustifolia* 等を区別しているが, 標本上の区別で, 実際にこのような区別はみとめがたい。

776. *E. × reflexa* Morren et Decne. **ウラギンツルグミ** マルバツルグミ ツルグミとナワシログミとの雑種, [京]福知山, [大]飯盛山, 箕面, [兵]裏六甲, [三]朝熊山。本→九。

777. *E. × submacrophylla* Sarvettaz **オオナワシログミ** ナワシログミとオオバグミとの雑種, 海岸生, X—Ⅺ, [三]朝熊山, 有馬, 津, [和]瀬戸鉛山, 比井村, 白崎, 和歌浦, [大]多奈川村。本(中部以西)→九, 朝。

778. *E. Takeshitai* Makino **カツラギグミ** 葉は両面淡色の星毛あり, V, [大]金剛山, 葛城山, 水分。本(泉山脈)。

779. *E. umbellata* Thunb. **アキグミ**⁶¹⁾
V, [兵]的形, 広石村, 柏原山(淡), 東六甲, 甲東園, 藍本村, 小金岳, [京]向日町, 柳谷, 老坂, 越畑, ルリ溪, 篠村, 比叡山, 田辺町, 湊村 (var. *obtusifolia* Araki の Type), 久美浜町, [大]葛城山, 金剛山, [滋]伊吹山, 油日, 赤坂山, 鈴鹿峠, 茶臼山, 饗庭野, [和]小倉村, 粉河, 志賀野村, 竜門山, 和佐村, 高田村, 高野山, 玉置口村, 根来山, 大島, [三]小俣町, 朝熊岳, 安楽島, [奈]宇陀。北→九, 朝, 満, 支。[新牧野図鑑1664]

f. *Higuchiana* (Honda) Hara **キミノアキグミ**⁶²⁾
実は黄熟, [兵]丹波。本→九。

f. *sulcata* (Honda) Hara **タテミゾアキグミ**
果実の表面生時縦溝がある。[兵]城北村, [大]十三峠。本。

var. *coreana* (Lév.) Lév. **カラアキグミ**
ミチノクアキグミ, 葉面に早落性星毛あり, [兵]小金岳, [京]山科, 奥上林, [奈]宇賀志村。本, 九, 朝。

780. *E. Yoshinoi* Makino **ナツアサドリ**
葉は卵状円形, 密に褐色星毛あり, IV—V, [兵]八多村, 船越山, 書写山, 八頭寺道, 篠首, 有年村。本(兵庫県, 中国地方)。

47. Thymelaeaceae ジンチョウゲ科

781. *Daphne kiusiana* Miq. **コショウノキ**
常緑, がく外面短毛あり, IV, [兵]船越山, 論鶴羽山, [大]牛滝, [京]内宮, [奈]春日山, 高取山, [三]赤目, 関町, [和]北山村, 大塔村。本→琉, 朝。[新牧野図鑑1652]

782. *D. Miyabeana* Makino **カラスシキミ**
常緑, がく外面無毛, V, [京]魚谷峠, 棧敷岳, [滋]比良積迎岳。本(近畿以北)→北。[新牧野図鑑1654]

783. *D. pseudo-mezereum* A. Gray **オニシバリ**

ナツボウズ 落葉, Ⅲ—IV, [兵]粟鹿山, [京]三岳山, 天田郡室山, [滋]伊吹山, 霊山, [奈]弥山—行者選間。本→九。[新牧野図鑑1650]

784. *Wikstroemia albiflora* Yatabe **ミヤマガンピ**
葉無毛対生, 花白, V, [奈]大台ヶ原大蛇窟。本(大台原), 四, 九。[寺崎図譜続2734図]

785. *W. Ganpi* (Sieb. et Zucc.) Maxim. **コガンピ** 葉長だ円形, 互生, Ⅷ, [兵]六甲山, 甲陽園, [京]胡麻原, 甘南備山, 六人部村, [大]犬鳴山, 葛城山, 新家村, [滋]老上村, [和]北山村, 大島, 竜門山, 湯ノ峰, [三]熊野市, 有馬池, 上津村, 菅島, 朝熊岳, [奈]春日山。本(関東以西)→九。[新牧野図鑑1657]

786. *W. sikokiana* Fr. et Sav. **ガンピ**
葉は互生卵形, 有毛, VI, [兵]高柳村, 外野, 書写山, 六甲山, 関ノ宮, [京]亀岡町, 大江山, [滋]仰木峠, 沖島, 南郷, [大]山本, 信貴山, [奈]内牧村, [和]鳥尾城村, 木津呂, [三]菅島, 外宮, 大杉谷, 御在所山, 積迎岳。本(東海道以西)→九。[新牧野図鑑1656]

787. *W. trichotoma* (Thunb.) Makino **キガンピ**
葉は対生無毛, 黄花, Ⅷ—IX, [兵]八千代村, 粟鹿峰, 千ヶ峰, 仁川, 有馬, 六甲山, 高仙寺山, 鷲林寺, [京]魚谷峠, 半国山, ルリ溪, 鳥岳, [三]神志山村。本(近畿以西)→九, 朝。[新牧野図鑑1658]

48. Stachyuraceae キフシ科

788. *Stachyurus praecox* Sieb. et Zucc. **キフシ** Ⅲ—IV, [兵]須賀山, 柏原山(淡), 神戸, [京]鞍馬, 比叡山, 貴船, 知井村, 嵐山, ルリ溪, 長老岳, 三岳山, 久多, 峰山, [滋]茨川, 金糞岳, 御池岳, 米原町, 横川, 比良山, 高時村, [大]本山寺, ポンポン山, 箕面, [奈]玉置山, 宇賀志村, 金剛山, [和]秋津川村, 由良町, 上富田町, 久生屋, 寄絶峽, 大塔村, 古座, [三]平倉‘鈴鹿峠, 野登山。北→九。[新牧野図鑑1643]
var. *Matsuzakii* (Nakai) Makino **ハチジョウキフシ** 葉は厚くて大きく, 果実も大, 海岸生, Ⅲ, [京]下宇川村, 経ヶ岬, [兵]柏原山(淡), 三熊山, [和]東富田村, 三枝村, 大島, 和深村, [三]安楽島, 大泊。本(関東以西)→四。[寺崎図譜続2746図]

49. Flacourtiaceae イイギリ科

789. *Idesia polycarpa* Maxim. **イイギリ** IV, [京]知井村, [兵]余部村, [大]牛滝, [和]大塔村, 玉置口村, [三]大杉谷。本→九, 支。[新牧野図鑑1642]

790. *Xylosma congestum* (Lour.) Merr. **クスド**

註61) コバンバアキグミ, ヒロハアキグミ荒木: 北陸の植物4巻80は区別する必要はないと考える。

註62) 本田: 植物学雑誌49巻16頁(1946)による。

イゲ K, [和]神島, 和歌山城跡, 下芳養村, [兵]猪鼻谷(淡)。本(福井県以西)→台, 朝, 支, フリピン。[新牧野図鑑1641]

50. *Violaceae* スミレ科

791. *Viola Bisseti* Maxim. ナガバノスミレサイシン IV, [京]比叡山, 古知谷, [三]朝熊岳。本(関東以西太平洋側)→九。[北村原色離弁108, 新牧野図鑑1615]

792. *V. Boissieuana* Makino ヒメミヤマスミレ IV, 白花, 葉はうすく鋸歯が目立つ, [兵]有馬, [奈]大台辻, 山上岳, 稲村岳, 玉置山, [和]瀨八丁, [三]朝熊岳, 魚飛, 尾鷲, 有馬。本(関東以西)→九, 済。[北村原色離弁120, 新牧野図鑑1625]

793. *V. brevistipulata* (Fr. et Sav.) W. Becker オオバキスミレ V, [滋]赤坂山, 明王ヘゲ, 三重岳, 三国山, 鳥打峠, [京]芦生。本(裏日本)。[北村原色離弁95, 新牧野図鑑1597]

794. *V. chaerophylloides* (Regel) W. Becker ヒゴスミレ ナンザンズミレ IV-V, [兵]摩耶山, 六甲山, 久下村, [京]野間村, 弥山, 鴻応山, [大]岩湧山, [奈]室生, 宇賀志村, [和]生石岳。本(関東以西)→九, 満, ウスリー。[北村原色離弁104]

795. *V. eizanensis* (Makino) Makino エイザンズミレ エゾスミレ IV-V, [兵]芦田村, [京]八瀬, 比叡山, 貴船, 芦生, [大]岩湧山, [滋]比良山, [奈]金剛山, 玉置山, [和]七川村, [三]御在所山, 美杉村。本→九。[新牧野図鑑1639]

796. *V. Grayi* Fr. et Sav. イソスミレ セナミスミレ IV, 海岸生, [京]久美浜, 箱石。本(北部及び裏日本海岸)。

797. *V. grypoceras* A. Gray タチツボスミレ IV-V, [兵]八千代村, 高浪山, 赤井野, [京]貴船, 大文字山, 比叡山, 愛宕山, 大原野, 醍醐。江文峠, 西大谷, 杓掛, 保津, 福知山, 芦生, 西別院村, 日吉町, [大]箕面, 金剛山, [滋]霊仙山, 醒ヶ井, 鳥越峠, 高時村, 茨川, 鞍掛峠, 永源寺, 三国山, 赤坂山, 坊村, 伊吹山, [奈]宇賀志村, 榛原, 野迫川村, [和]高野山, 大島, 黒島, 田辺, 白浜, 新和歌浦, 古座, [三]小岐須, 御在所山, 須賀利村, 井戸, 藤原岳。北→琉, 朝, 支。[北村原色離弁103, 新牧野図鑑1605]
f. *brevicalcarata* (Nakai) F. Maekawa バンダタチツボスミレ タンバタチツボスミレ 花小形で距はごく短い。[京]袖原, [三]上野, [滋]伊吹山。

f. *pubescens* (Nakai) Mizushima ケタチツボスミレ 花柄及び葉面に細毛あり, [京]袖原, [三]三田, [和]大沼。

f. *purpurellocalcarata* (Makino) Hiyama オトメスミレ 花白, 距のみ淡紫色, [京]大見。

var. *exilis* (Miq.) Nakai コタチツボスミレ 小形で花後枝はほう, [京]醍醐, 比叡山, 高尾, 保津峡, [滋]伊吹山, 赤坂山, 醒ヶ井, 藤原岳, [大]金剛山, [兵]富島町, [奈]室生, 洞川, 稲村岳, [和]田辺, [三]御在所山, 鳥羽, 美杉村。本(千葉県以西)→琉, 朝。

798. *V. hsrטיפes* S. Moore サクラスミレ IV-V, 葉柄は花柄と共に開出粗毛あり, がくは無毛 [兵]生野, [奈]宇賀志村, 三本松。北→九, 朝, 満, 支, ウスリー。[北村原色離弁115, 新牧野図鑑1634]

799. *V. hondoensis* W. Becker et Boissieu アオイスミレ IV, [京]嵐山, 比叡山, 大原, 鞍馬, 貴船, 古知谷, 烏ヶ岳(天田郡), [大]剣尾山, 尺代, [奈]洞川, 金剛山, [和]高野山, [滋]伊吹山, 霊仙山, 永源寺町, 高時村, [三]藤原岳。北→九。[北村原色離弁98, 新牧野図鑑1611]

800. *V. ibukiana* Makino ヒメキクバスミレ ヒゴスミレとヒナスミレとの雑種と思われる。IV, [兵]六甲山, [大]岩溜山, [三]種生村, [奈]宇賀志村。本→九。

801. *V. japonica* Langsd. コスミレ IV-V, [兵]書写山, 米田村, 先山, 鴨庄村, [京]大原野, 貴船, 東和東村, 銀閣寺, 山端, 保津, 福知山, 烏帽子岳, [滋]伊吹山, 滋賀里, 西庄村, 大君畑, 御池岳, 霊仙山, 土山町, [奈]入之波, [和]近野村。本→九, 朝。[北村原色離弁114, 新牧野図鑑1637]

f. *barbata* Hiyama ヒゲコスミレ 側片内面有毛, [京]大山崎, 青葉山, 烏帽子岳, 上植野, [兵]小金岳, [大]池田。

802. *V. Keiskei* Miq. マルバスミレ 無毛, IV-V, [兵]船越山。本(関東以西)→九, 朝。[北村原色離弁105, 新牧野図鑑1628]

f. *Okuboi* (Makino) F. Maekawa ケマルバスミレ 葉は有毛, [兵]朝来町, [京]長老岳, 芦生, 三岳山, [滋]君ヶ畑, [大]ボンボン山, 箕面, [和]八幡村 [三]大又。[新牧野図鑑1629]

803. *V. Kusanoana* Makino オオタチツボスミレ IV-V, [兵]氷ノ山, [京]貴船, 比叡山, 西大谷, 嵐

註63) var. *minor* Nakai ダイセンクスミレ原: 日本種子植物集覧 198(1954)では当地方のものはこれにあててあるが, ガレ場でごく小さくなったものはこの形になる。これは生育地の環境によるもので, そうでないものは大きくなり葉もうすくなるので, 筆者は少なくとも当地のものは変種にはみとめ得ない。var. *minor* が変種としてみとめ得るかどうかは再考を要する。

山, 大悲山, 山科, 芦生, 青葉山, 三岳山, 冠島, 佐々里峠, 福知山, [滋]大君ヶ畑, 彦根, 大津, 高時村, 金糞岳, 赤坂山, [和]黒島, [大]牛滝山。北→九。
[北村原色離弁101, 新牧野図鑑1608]

f. brevicealcarata (Hara) F. Maekawa ヒダカタ
チツボスミレ 花小さく距は短い, [京]福知山。

804. *V. mandshurica* W. Becker スミレ
Ⅳ—Ⅴ, [京]比叡山, 保津峡, 岡崎, 花園, 向島, 芦生, 長老岳, 佐々里峠, 千歳, [滋]霊仙山, 膳所, 安楽律院, 伊吹山, 比良, [大]大沢, [奈]滝野, [和]高田村, 大島, [三]野登山, 木本。北→九, 朝, 満, 支, シベリア。[北村原色離弁110, 新牧野図鑑1361]
f. albescens (Nakai) Hiyama コシロバナスミレ [奈]秦原, [京]向島, [滋]治田村。

f. glabra (Nakai) Hiyama ケナシスミレ [兵]朝来町, 筍飯野浜, [京]嵯峨, 嵐山, 宇治田原村, 福知山, 久美浜町, [滋]膳所, 柳ヶ瀬, 米原町, [和]日高町, 大島, 滝門村, 田辺町, 古座, 瀬戸, [三]有馬。

805. *V. Maximowicziana* Makino コミヤマスミレ
Ⅴ, [奈]奈良, [和]北富田村, 北山村, 那智, [三]尾鷲, 鈴鹿峠。本(関東以西太平洋側)→九。[北村原色離弁117, 新牧野図鑑1626]

806. *V. minor* (Makino) Makino ヒメスミレ
Ⅳ—Ⅴ, [兵]朝来町, 山本, [京]岡崎, 保津峡, 嵐山, 醍醐, 大枝, 向島, 六地藏, 北白川, 福知山, 中六人部村, 千歳, [大]岩湧山, [滋]葛川, 篠原, [和]生島, 白浜。本→台。[北村原色離弁112, 新牧野図鑑1633]

807. *V. mirabilis* L. var. subglabra Ledeb.
イブキスミレ Ⅳ—Ⅴ, [滋]伊吹山。本, 朝, 満, シベリア。[北村原色離弁100, 新牧野図鑑1610]

808. *V. obtusa* (Makino) Makino ニオイタチツボスミレ Ⅳ—Ⅴ, [兵]西宮, 大原山, [京]比叡山, 岡崎, 八木町, 大江山, [滋]雄琴, 鳥居本, 十禅寺, 大津, [大]葛城山, [奈]金剛山, 宇賀志村, [和]田辺, 大島, [三]有馬, 伊勢市。[新牧野図鑑1606]

809. *V. × Ogawai* Nakai カツラギスミレ
エイザンスミレとシハイスミレとの雑種と思われる。
Ⅳ, [大]横山村, 葛城山。本。[東亜植物図説Ⅲ—1: 78図]

810. *V. ovato-oblonga* (Miq.) Makino ナガバナ
タチツボスミレ Ⅳ—Ⅴ, [兵]葛野村, 朝来町, 大原山, 前山村, 西谷村, [京]比叡山, 鞍馬, 保津峡, 嵯峨, 福知山, 半国山, 和知, 知井村, [大]箕面, 山本, [和]友ヶ島, [滋]小関, [三]伊勢市。本(静岡県

以西)→九, 朝。[北村原色離弁102, 新牧野図鑑1607]
f. pubescens (Nakai) F. Maekawa ケナガハ
タチツボスミレ 茎や花柄に細毛あり, [大]枚方, [京]佐賀村。

811. *V. Patrini* DC. シロスミレ
やや湿った地に生える。Ⅳ—Ⅴ, [兵]六甲山, [京]八木町, 花園。樺→九, 朝, 満, シベリア。[北村原色離弁109, 新牧野図鑑1630]

812. *V. phalacrocarpa* Maxim. アカネスミレ
葉は細毛あり, Ⅳ—Ⅴ, [兵]朝来町, 六甲山, [大]葛城山, [奈]金剛山, 多武峰, 宇賀志村, [滋]比叡山。北→九, 朝, 満, 支。[北村原色離弁113, 新牧野図鑑1635]
f. glaberrima (W. Becker) F. Maekawa オカ
スミレ 葉は無毛, [兵]神鍋山, 朝来町, [京]大江山, [大]岩湧山, [奈]金剛山。

813. *V. pumilio* W. Becker フモトスミレ
Ⅳ—Ⅴ, [兵]六甲山, 比良山, [京]比叡山, 醍醐, 大悲山, 八幡町, 上賀茂, 鷲峰山, 雀部村, [滋]大津, 水口, 三上村, 君ヶ畑, 伊吹山, 雄琴, 綿向山, 横川, [奈]高見山, 稲村岳, 山上岳, [三]御在所山, 野登山, 五ヶ所, 鎌ヶ岳, [和]小口。本→九。[北村原色離弁, 119, 新牧野図鑑1624]

814. *V. Rossii* Hemsl. アケボノスミレ
Ⅴ, [滋]伊吹山, 稀。千→九, 朝, 満, 支。[北村原色離弁106, 新牧野図鑑1613]

815. *V. rostrata* Pursh ナガハシスミレ⁶⁵⁾
Ⅳ—Ⅴ, 距が長い, [滋]霊仙山, [京]棧敷岳。本(鳥取県以北真日本), 北米東部。

816. *V. shikokiana* Makino シコクスミレ
Ⅳ—Ⅴ, [兵]朝来町, [奈]弥山, 玉置山。本(関東以西太平洋側)→九。[北村原色離弁118, 新牧野図鑑1618]

817. *V. Takedana* Makino ヒナスミレ
Ⅳ—Ⅴ, [兵]六甲山, 朝来町, 岩上谷(播), [京]三岳山, [和]生石岳, [滋]綿向山, [三]野登山。本→九。[新牧野図鑑1621]

818. *V. vaginata* Maxim. スミレサイミン Ⅳ—Ⅴ, [京]大原, 貴船, 大悲山, 芦生, 大江山, 青葉山, 日吉町, 綾部市, 足占山, 成相山, [滋]高時村, 金糞山, 三国岳, 伊吹山, 武奈岳, [兵]妙見山, 城崎, 北→本(日本海側)。[北村原色離弁107, 新牧野図鑑1614]

819. *V. verecunda* A. Gray ツボスミレ ニオイ
スミレ Ⅳ—Ⅴ, [兵]朝来町, 鮎原村, [京]嵐山, 花園, 上賀茂, 貴船, 愛宕, 北白川, 向島, 三岳山,

註64) 井上: 分布略説兵庫県植物目録(1953)にタチスミレが出ているが, 標本を見ず, おそらく同定の誤りではないかと思われる。

註65) 竹内: 京都府草木誌 p.56(1962)による。

西本梅村, [滋]膳所, 今津, 西庄村, 多羅尾村, 伊吹山, 甲南町, 金糞岳, 比叡山, 靈仙山, 八雲ヶ原, 高時村, 坊村, [大]箕面, [和]高野山, 上岩出村, 田辺町, 瀨八丁, [奈]字賀志村, 金剛山, [三]木本, 相賀町. 樺→台, 朝, 満, 支. [北村原色離弁 99, 新牧野図鑑1600]

var. *semilunaris* Maxim. アギスミレ IV-VI, [兵]裏六甲, 黒井町, 寺前村, [京]坂尻, 半国山, 弓削村, 鷲峰山, [滋]石山, 八尾国有林, [奈]室生, 春日山, [大]山本, [三]外宮, 神戸, 稲生村, 赤目, [和]色川村. 北→九. [新牧野図鑑1601]

820. *V. violacea* Makino シハイスミレ IV-V, [京]小金岳, 船越山, 先山, 三熊山, 大岡山(城崎), [京]大悲山, 比叡山, 保津峡, 大文字山, 甘南備山, 八瀬, 嵐山, 高雄, 千歳村, 福知山, 頭巾山, 洞峠, [滋]高時村, 藤原岳, 飯道山, 北比良峠, 綿向山, [大]能勢妙見, ポンポン山, 箕面, 山本, 島本町, 岩湧山, [奈]稲村岳, 金剛山, [和]田辺, 瀬戸, 由良, 奇絶峡, 大島, [三]美杉村, 御在所山, 熊野市. 本→九. [北村原色離弁121, 新牧野図鑑1623]

821. *V. yedoensis* Makino ノジスミレ IV-V, [兵]朝来町, [京]比叡山, 八木町, 上豊富村 [滋]伊吹山, 十禅寺, [和]丸栖村. 本→九, 朝, 支. [北村原色離弁111, 新牧野図鑑1632]

51. *Elatinaceae* ミソハコベ科

822. *Elatine triandra* Schk. イヌミソハコベ⁶⁶⁾
果実は無柄, VI-VIII, [京]一乗寺, 五十河村, [大]大阪市豊里, [滋]瀬田川. 日本全土, 欧亜大陸, 北米, 北アフリカ.

52. *Guttiferae* オトギリソウ科

823. *Hypericum Ascyron* L. トモエソウ⁶⁷⁾
VI-VIII, [兵]千ヶ峰, 葛野村, 千種村, 鉢伏山, 神楽村, 神戸, [京]芦生, 大見, 上六人部村, 豊富村, [滋]伊吹山, [大]金剛山, [奈]大峰山, [三]尾鷲, 飛鳥村. 北→九, 東亜, アルタイ. [北村原色離弁126, 新牧野図鑑1580]

824. *H. erectum* Thunb. オトギリソウ⁶⁸⁾
変化多し, VI-VIII, [兵]六甲山, 有馬, 氷ノ山, 後川

村, 三室山, 八代千村, [京]比叡山, 半国山, 長老岳, 芦生, 大江山, 福知山, 深見峠, 太鼓山, [滋]比良山, 木本町, 金糞岳, [大]葛城山, [奈]玉置山, 前鬼, 入之波, 室生, [三]菅島, 新宮, 笠取山, 朝熊岳, 飯野村, [和]大島, 中辺路町, 川添村, 竜門山. 樺→九, 朝. [北村原色離弁132, 新牧野図鑑1582]

var. *caespitosum* Makino フジオトギリ 葉は細く茎は叢生, VII-VIII, [滋]比叡山, 釈迦岳, 鎌ヶ岳. 本. [新牧野図鑑1583]

825. *H. kinashianum* Koidz. ミヤコオトギリ
葉は細くて薄い, ホソバオトギリの日陰に生えたものとの区別困難である. VII, [京]愛宕山 (Type), [大]葛城山, [滋]山上村, [奈]前鬼, [三]平倉, 御在所山, 野登山. 本→九.

826. *H. oliganthum* Fr. et Sav. アセオトギリ
葉は明点でふちに黒点あり, 果実は卵球形, VII-VIII, [兵]日置村, 篠山, 有年村, [京]山科, 若王寺, 富本村, 上六人部村, 下川口村, [滋]膳所, 石山, [三]御在所山. 本→九, 朝(南). [新牧野図鑑1590]

827. *H. pentholocles* Koidz. タコアシオトギリ
オトギリソウの花序の伸長した1つの畸形である. VII-IX, [京]棧敷岳 (Type), 長老岳, 大江山, 愛宕山, [滋]比叡山, 比良山, [兵]後川村, [三]九鬼村. 本.

828. *H. pseudopetiolum* R. Keller サワオトギリ
葉は明点でふちだけ黒点, VII-IX, [兵]妙見山, 蘇夫岳, 杉原谷村, 妙高山(水上郡), 栗鹿山, 段ヶ峯, 三室山, 千種村, 音水国有林, 室埴村, 小代村, 温泉村, [京]比叡山, 高雄, 黒田村, 弓削村, 宇治田原村, 芦生, 福知山, 大江山, 長老岳, 太鼓山, 君尾山, [滋]飯道寺山, 靈仙山, 金糞岳, 大津, [大]箕面, [奈]大峰山, 大台ヶ原山, [和]大塔村. 北→九. [北村原色離弁129]

var. *kiusianum* (Y. Kimura) Y. Kimura ナガサキオトギリ 葉は細い, [和]高野山, 富里村, [大]金剛山, [奈]釈迦岳, 弥山, 山上岳, 大台原, 玉置山 [三]森村, 矢川峠, 池宿. 本(伊豆以西太平洋側)→九.

829. *H. perforatum* L. var. *angustifolium* DC.
コゴメオトギリ VI-VII, [三]安楽島. ヨーロッパ原産帰化.

註66) 近畿産の筆者の見た標本は果実が無柄のイヌミソハコベばかりで, 有柄のミソハコベはまだ見ていない.
註67) 竹内: 京都府草木誌p.54(1962), 兵庫県博物館: 播磨植物目録p.42(1935), 井上: 兵庫県植物目録と名篇p.30(1953)にコウライトモエソウが出ているが, 近畿産のものは花柱は長さ6-10mmでコウライトモエソウではない.

註68) ヨサオトギリ *H. Takeuchianum* Koidz. は海岸に生えて花序がつまった形である. [京]伊根村 (Type), 浜詰. クルマバオトギリ *H. Kanae* Koidz. は葉の3枚生じたもの [京]物部村 (Type). ミツバオトギリ *H. verticillatum* Koidz. も同じく3枚葉のもの [京]花背峠 (Type). ホソバオトギリ *H. erectum* var. *angustifolium* Y. Kimura は葉の細い形 [京]小川村 (Type). ヒロハオトギリ *H. e. var. pillosum* Y. Kimura は葉の特に巾広いもの [三]伊賀上野 (Type) である.