

兵庫県のハムシ (VI)*

高橋寿郎

Chrysomelid-Beetles (Coleoptera) from Hyōgō Prefecture (VI)
by Toshio Takahashi

本文に入るに先立ち木元新作博士より日浦勇氏との共著になる“大阪市立自然科学博物館に所蔵されるハムシ類標本(第三報)”(大阪市立自然科学博物館研究報告, 第25号, 1971)なる論文の別刷の御恵送に預った。この論文で日本産ハムシ類の4新種の記載があり兵庫県産の標本も多く記録されている(43種), この新種記載の内1種は兵庫県, 和歌山県からの記録であり, 兵庫県未記録種が3種ある, いづれも本報文第1~5報迄に報告した亞科に属する種であるので始めにその種名を記しておきたい, また筆者自身の調査で新たに1種追加が出来たのでそれもふくめておく, 従って今回は番号(222)より始ることになる。

○*Cryptocephalus kiyosatonus* Kimoto, モモグロチビツツハムシ(ツツハムシ亞科), 養父郡関宮町福定~氷の山 [2 exs., 9-VI-1967, 宮武採集]
○*Monolepta tsushimaum* Kimoto, ツシマアシナガハムシ(ヒゲナガハムシ亞科), 養父郡鉢伏山800~1200m [2 exs., 13-VI-1967, 宮武採集], 関宮町大久保[3 exs., 11-VI-1967, 宮武採集], 本州新記録。

○*Lythraria salicariae* (Paykull)=*L. komiyamai* (Ohno) ヒメカクムネトビハムシ(トビハムシ亞科), 川西市一の鳥居寒天干場 [1 ex., 1-VII-1961, 日浦採集]

○*Sphaeroderma atrum* Jacoby, クロタマノミハムシ(トビハムシ亞科), 宍粟郡音水 [1 ex., 10-V-1970]
○*Zipanginia miyatakei* Kimoto, ミヤタケグミトビハムシ(トビハムシ亞科), 養父郡関宮町, 福定~氷の山で宮武頼夫氏が採集した3頭の標本(9-VI-1967)を Holotype, Paratypesとして記載された種。

Subfamily Hispinae Baly トゲハムシ亞科
Genus *Dactylispa* Weise トゲハムシ属

222. *Dactylispa angulosa* (Solsky)
ヒメキベリトゲトゲ
A-p. 1208, f. 3475. B-pl. 20, f. 429, p. 68. C-

pl. 174, f. 3, p. 347.

産地; Hiogo [Baly, 1874], Kobe [Lewis, 7-VI-1881], 神戸市山の街 (1 ex., 5-V-1955, 2 exs., 29-IV-1957), 金剛童子山(2 exs., 24-VI-1956), 氷上郡(山本, 1953, 1958), 宍粟郡音水 (1 ex., 10-V-1970, 1 ex., 31-V-1970).

223. *Dactylispa masoni* Gestro キベリトゲトゲ
C-pl. 174, f. 4, p. 347.

産地; 神戸市谷上 (1 ex., 29-IV-1958)

224. *Dactylispa subquadrata* (Baly)
カタピロトゲトゲ
A-p. 1208, f. 3476. B-pl. 20, f. 428, p. 68. C-pl. 174, f. 7, p. 347.

産地; Hiogo [Baly, 1874, Lewis, 1♂, 1♀, 7-VI-1881], 神戸市御影(関, 1933), 布引, 烏原, 山の街, 箕谷, 丹生山, 藍那, 氷上郡黒井(山本, 1953, 1958), 養父郡氷の山(高橋, 1959)

Genus *Hispellinus* Weise カヤノトゲハムシ属

225. *Hispellinus moerens* (Baly) カヤノトゲトゲ
A-p. 1208. C-pl. 174, f. 1, p. 347.

産地; 養父郡氷の山(高橋, 1959)

Genus *Rhadinosa* Weise ススキトゲハムシ属

226. *Rhadinosa nigrocyanea* (Motschulsky)
ススキトゲハムシ
A-p. 588, f. 1150. B-pl. 19, f. 410, p. 66. C-pl. 174, f. 2, p. 347.

産地; 神崎郡大河内町延ノ峰830m [3 exs., 6-VI-1965, Hiura leg., 木元, 日浦, 1971], 朝来郡生野(1 ex., 8-VI-1956)

Subfamily Cassidinae Stephens

カメノコハムシ亞科

Genus *Aspidomorpha* Hope ジンガサハムシ属

* 兵庫県甲虫相資料, 35.

227. *Aspidomorpha difformis* (Motschulsky)

シンガサハムシ

A—p. 1209, f. 3477. C—pl. 174, f. 8, p. 347.

産地；神戸市御影(関, 1933), 氷上郡(山本, 1953, 1958)

228. *Aspidomorpha transparipennis* (Motschulsky)

スキバジンガサハムシ

A—p. 1209, f. 3478. B—pl. 20, f. 436, p. 69. C—pl. 174, f. 9, p. 347.

少い種のようである。本種の生態については安富氏の詳しい報文がある(応用昆虫, VII-1: 14~19, 1951).

産地；川西市一の鳥居(1 ex., 17-VII-1958, Hiura, leg. 木元, 日浦, 1971), 神戸市御影(関, 1933), 山の街(1 ex., 30-VI-1963), 氷上郡(山本, 1958), 出石郡出石町(高橋, 1963), 赤穂郡三濃山(1 ex., 7-V-1964, 大野, 1967), 養父郡氷の山(1 ex., 27-VI-1956)

Genus *Cassida* Linné

カメノコハムシ属

229. *Cassida fuscorufa* Motschulsky

ヨモギカメノコハムシ

C—pl. 174, f. 13, p. 348.

本種の生態に就いては大野氏の詳しい報文がある(昆虫界, X III, 124: 79~83, 1955).

産地；神戸市六甲山(1 ex., 30-V-1937, 大野, 1955), 布引(1 ex., 17-V-1959), 烏原(1 ex., 25-VI-1948), 氷上郡(山本, 1953, 1958), 飾磨郡雪彦山(1 ex., 14-VII-1957), 宍粟郡音水(1 ex., 20-VII-1959, 1 ex., 20-VII-1969), 養父郡氷の山(1 ex., 25-VII-1959)

230. *Cassida nebulosa* ·Linné

カメノコハムシ

A—p. 1209, f. 3479. B—pl. 20, f. 430 & 431, p.

68. C—pl. 174, f. 12, p. 347.

本種の生態に関しては安富氏の詳しい報文がある(昆虫界, XI, 117, pp. 605~620, 1943, 応用昆虫, IV, 4, pp. 218~220, 1948)。県下に普通に産する。

産地；川西市一の鳥居寒天干場(木元・日浦, 1971), 神戸市御影(関, 1933), 布引, 烏原, 氷上郡柏原(山本, 1953, 1958), 飾磨郡雪彦山, 赤穂郡三濃山(大野, 1967), 宍粟郡音水, 養父郡氷の山。

231. *Cassida piperata* Hope

ヒメカメノコハムシ

A—p. 1210, f. 3481. B—pl. 20, f. 433, f. 69. C—pl. 174, f. 13, p. 348.

普通種

産地；川西市一の鳥居(木元, 日浦, 1971), 神戸市御

影(関, 1933), 布引, 烏原, 山の街, 箕谷, 有馬, 氷上郡(山本, 1953, 1958), 出石郡出石町(高橋, 1963), 飾磨郡雪彦山, 宍粟郡船越山(木元, 日浦, 1965), 宍粟郡音水。

232. *Cassida rubiginosa* Müller

アオカメノコハムシ

C—pl. 174, f. 17, p. 348.

県下では稀のようである。

産地；氷上郡神楽村(山本, 1953, 1958), 多可郡鳥羽(1 ex., 29-IV-1972), 養父郡氷の山(中根, 1953)

233. *Cassida sigillata* (Gorham)

イカリモンカメノコハムシ

A—p. 1212, f. 3487. C—pl. 174, f. 23, p. 348.

産地；氷上郡柏原(山本, 1953, 1958), 赤穂郡三濃山(6 exs., 7-V-1964, 大野), 養父郡氷の山(中根, 1953)

234. *Cassida versicolor* (Bohemian)

セモンカメノコハムシ

A—p. 1212, f. 3486. C—pl. 174, f. 22, p. 348.

産地；神戸市市山の街(1 ex., 10-VII-1949), 箕谷(1 ex., 16-V-1948, 1 ex., 24-VI-1948), 丹生山(1 ex., 15-V-1955), 氷上郡(山本, 1953, 1958), 出石郡出石町(高橋, 1963), 淡路島(大野, 1969), 赤穂郡三濃山(1 ex., 7-V-1964, 大野, 1967), 城崎郡城崎(1 ex., 17-V-1970), 宍粟郡音水(1 ex., 25-V-1958, 木元, 日浦, 1965)

235. *Cassida vittata* Villers

スジミドリカメノコハムシ

A—p. 1210, f. 3482. C—pl. 174, f. 16, p. 348.

産地；氷上郡芦田村(VI-1951, 山本, 1953, 1958)

236. *Cassida vespertina* Boheman

セダカカメノコハムシ

A—p. 586, f. 1145. B—pl. 10, f. 438, p. 69. C—pl. 174, f. 18, p. 348.

古く兵庫は Baly による記録はあるが個体数は少いようである。

産地；Hiogo (Baly, 1874), 神戸市丹生山(1 ex., 5-V-1956), 淡路島(大野, 1969), 氷上郡神楽村(山本, 1953, 1958), 赤穂郡三濃山(3 exs., 7-V-1964, 大野, 1967)(1 ex., 7-V-1972).

Genus *Thlaspidia* Weise

アツバジンガサハムシ属

237. *Thlaspidia biramosa* Spath

イチモンジカメノコハムシ

A—p. 1211, f. 3484. C—pl. 174, f. 21, p. 647.

個体数は多い。

産地；神戸市六甲山, 布引, 二十渉, 烏原, 丹生山,

氷上郡〔山本, 1953, 1958〕, 柏原, 淡路島〔大野, 1969〕,
赤穂郡三濃山, 宍粟郡音水, 養父郡氷の山。

238. *Thlaspidia lewisii* (Baly) ルイスカメノコハムシ
A-p, 1211, f. 3485. C-pl. 174, f. 20, p. 348.

産地; Hyogo [Baly, 1874, Gorham, 1885], 神戸市
金剛童子山 (1 ex., 24-VI-1956), 有馬 (4 eexs., 14
-V-1967), 宍粟郡音水 (1 ex., 31-V-1970)

* * * * *

以上兵庫県産ハムシ類15亜科, 238種の記録をした。

現在の日本産ハムシ類は16亜科, 566種 (大野, 1971,
木元, 日浦, 1971) が知られている。したがって日本産
ハムシ類の約4割を産することがわかっている。これは
兵庫県に産するハムシ相の8割位がわかっているのでは
ないかと考へている。兵庫県特産種というのも2種ある
が概して日本列島に広く分布する広布種が基盤となっ
ているようである。兵庫県産ハムシ相の全般的な考察・概
説はいづれ稿を改めて発表したく考へている。

(11-V-1972)