

近畿地方植物誌 28

村 田 源

1181. *Salix serissaefolia* Kimura コゴメヤナギ 湿地生 葉小形で粉白絹毛あり, V, (兵) 氷上町, 瀬川山, 成松町, 菟和田原, 白髪山, 有馬, 六甲山, 神津村, 布引滝, 逆瀬川, (大) 曾根, (京) 弥山, 福知山, 烏岳, 久美浜, 上賀茂, (滋) 伊吹村, 三上村, 日野町, 綿向山, 十禅寺, (和) 和歌山, 下秋津, 新宮, 田辺, (三) 御在所山, 野登山, 御船村。本 (関東-近畿)。〔北村原色木Ⅱ 787〕
1182. *S. Sieboldiana* Bl. ヤマヤナギ, ダイセンヤナギ V-V, (兵) 氷ノ山, 鉢伏山, 粟鹿峯, 砥ノ峯, 三室山, 笠形山, 六甲山, 扇ノ山, 鉢伏山, 音水, 船越山, 有馬, 千ヶ峯, (京) 芦生, 磯砂山, 赤石岳, 長老岳, (大) 金剛山, 飯盛山, (和) 護摩壇。本 (近畿以西), 四, 九。〔北村原色木Ⅱ 761〕
1183. *S. subfragilis* Anders. タチヤナギ V (兵) 城崎, (京) 上川口村, 烏岳, 福知山, 八木, 池尻, 向島, 大原野, 桂川, 芦生, 八瀬, 松ヶ崎, 宇治, (滋) 大津, 野洲川, 八幡, 多賀町, (大) 三国町, 堺, 服部, 高槻, (奈) 橿原市, 高取町。本 → 九, 朝, 支, ウスリー, 樺太。〔北村原色木Ⅱ 790, 新牧野図鑑 302〕
1184. *S. × thaumasta* Kimura ミヤコヤナギ ネコヤナギとキヌヤナギとの自然雑種と思われる。葉の裏に光沢のある白い絹毛が多い。Ⅲ-V, (兵) 六甲山 (Type) 玄武洞対岸, (京) 芦生, 八木町, 上鴨, 白川, (滋) 比叡山, 大津, 日野町, 篠原村, 芹谷村, (三) 藤原岳。本 (中部-中国)。
1185. *S. × ultima* Koidz. コンゴウバッコヤナギ バッコヤナギとサイゴクキツネヤナギとの雑種ではないかと考えられる。バッコヤナギに比し葉が小形で褐色のちぢれ毛が少し出る。V, (大) 金剛山 (Type), 生駒山, 岩湧山, (兵) 小金岳, 六甲山, (和) 八幡村。本 (近畿)。
1186. *S. × yamstoensis* Koidz. ヤマトヤナギ オノエヤナギとサイゴクキツネヤナギとの雑種と考えられるもの, V, (兵) 妙見山, 小金岳, 河梨峠, 蘇夫ヶ岳, 生野, 鉢伏山, 六甲山, (京) 上夜久野, 太鼓山, (滋) 御池岳, 綿向山, 鎌掛村, (奈) 金剛山 (Type), (和) 八幡村, 富里, (三) 鎌ヶ岳, 野登山, 高見山。本 (近畿)。
1187. *S. Yoshinoi* Koidz. ヨシノヤナギ V, (兵) 有馬, 神津村, 赤穂市, 朝来町, 城東町, 妙高山, 一宮町, 三木市, 鉢伏山, 武田尾, 伊丹, (京) 福知山,

芦生, 桂川, (和) 栖川村, (奈) 生駒町, 五条町。本 (近畿以西), 四。〔北村原色木Ⅱ 788〕

121 Juglandaceae クルミ科

1188. *Juglans mandshurica* Maxim. subsp. *Sieboldiana* (Maxim.) Kitamura オニグルミ V-V, (兵) 笠形山, 三方町, 粟鹿峯, 明神山, (京) 長老岳, 芦生, 由良岳, 上和知村, 静市野村, 貴船, (滋) 伊吹山, 金糞岳, (和) 高野山。樺, 北, 本, 四, 九。〔北村原色木Ⅱ 796, 新牧野図鑑 321〕
1189. *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. ノグルミ V, (兵) 西光寺山, 明神山, 三木市, 丹生山, 高見城山, 西淡町, 北淡町, 神戸市, 六甲山, 生野, 書写山, 鉢伏山, (大) 岬町, 砂川, (和) 鳥尾城村, 長野村, 上秋津村, 五西月村, 小倉村 (岩出町)。本 (東海以西), 四, 九, 朝, 台, 支。〔北村原色木Ⅱ 798, 新牧野図鑑 319〕
1190. *Pterocarya rhoifolia* Sieb. et Zucc. サワグルミ V, (兵) 三方町, 音水, 扇ノ山, 粟鹿峯, (京) 芦生, 大江山, (三) 大杉谷, (奈) 天川村。北, 本, 四, 九。〔北村原色木Ⅱ 797, 新牧野図鑑 320〕
1191. *P. stenoptera* C. DC. カンボウフウ シナサワグルミ V, 植栽, (兵) 神戸市, (大) 長居公園, (京) 京大植物園, (和) 中野上村。〔中国高等植物図鑑 I 758〕

122 Myricaceae ヤマモモ科

1192. *Myrica* Gale L. var. *tomentosa* C. DC. ヤチヤナギ V, (三) 三重郡大池。本 (三重県以東, 北, 樺, 千, 北朝鮮, 東シベリア)。〔北村原色木Ⅱ 800, 新牧野図鑑 318〕
1193. *M. rubra* Sieb. et Zucc. ヤマモモ V, (兵) 神戸市, 明石, 須磨, 三木市, (京) 天天山, 大原野, 東山, 男山, (大) 山中谷, (和) 新庄, 田辺市, 瀬戸, 大島, (三) 木本, 有馬, 須賀利村, (奈) 吉野, 十三峠。本 (関東以西), 四, 九, 琉, 朝, 台, 支。〔北村原色木Ⅱ 799, 新牧野図鑑 317〕

註 113) ヤチヤナギ, 南限。黒川: 伊賀地方産植物目録 66 (1960) による。

123 Chloranthaceae センリョウ科

1194. *Chloranthus japonicus* Sieb. ヒトリシズカ
Ⅴ-Ⅴ, (兵) 青垣町, 朝来町, (京) 上夜久野, 経
ヶ岬, 和知町, 黒田村, 棧敷岳, 龍ヶ岳, 貴船, 鞍馬,
大原野村, (滋) 比叡山, 伊吹山, 大君ヶ畑, (大)
高槻市, 金剛山, (奈) 柏木, 宇賀志村, 洞川, (和)
八幡村, (三) 藤原岳。北 → 九, 樺, 朝, 支。〔北村
原色離弁 648, 新牧野図鑑 294〕

1195. *C. serratus* (Thunb.) Roem. et Schult.
フタリシズカ Ⅴ-Ⅴ, (兵) 雪彦山, 小金岳, 明神
山, 市川町, 有馬, 洲本市, (京) 三岳山, 長老岳,
洞峠, 由良岳, 比叡山, 若王寺, 宇治田原, (滋) 伊
吹山, 金葉岳, 御池岳, 藤原岳, 西庄村, 八雲ヶ原,
葛川村, 霊仙岳, (大) 金剛山, 本山寺, (奈) 天川
村, 河合, 柏木, 大峯山, (和) 高野山, 秋津川村,
三川村, 大島, (三) 八幡村。北 → 九, 支。〔北村
原色離弁 649, 新牧野図鑑 295〕

1196. *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai センリョ
ウ Ⅴ, (兵) 生島, 赤穂市, (大) 堺, (和) 那智,
勝浦, 由良町, 三尾川, 本宮町, 大島, 湯ノ峯, 御坊
市, (三) 尾鷲, 魚飛。本(東海道以西, 四, 九, 台,
支, 印, マレーシア。〔北村原色離弁 647, 新牧野図
鑑 297〕

124 Piperaceae コシヨウ科

1197. *Piper Kadsura* (Choisy) Ohwi フウトウカズ
ラ (兵) 洲本, (和) 三尾川, 由良町, 那智, 江須
崎, 大島, 潮岬, 白崎, 美浜町, 太地, (三) 飛鳥,
浜島町, 御座町。本(関東以西), 四, 九, 朝(南),
琉, 小笠原。〔北村原色離弁 651, 新牧野図鑑 292〕

125 Saururaceae ドクダミ科

1198. *Houttuynia cordata* Thunb. ドクダミ Ⅴ-
Ⅴ, (兵) 笠形山, 氷上町, 笹ヶ峯, 三木市, 神戸市,
(京) 太鼓山, 大江町, 胡麻, 京北町, 綾部市, 大原,
比叡山, 深泥池, 北白川, 大原野, 男山(滋) 彦根,
鞍掛峠, (大) 金剛山, 高槻市, 山本, (奈) 奈良市,
前鬼, (和) 大島, (三) 平倉, 大沼。〔北村原色離
弁 653, 新牧野図鑑 291〕

1199. *Saururus chinensis* (Lour.) Baill. ハンゲシ
ョウ, カタシログサ Ⅴ, (兵) 香住町, 鎧, 豊岡
市, 東浦町, (大) 尼崎, (京) 向島, 金井戸, 宝池,
峰山町, 弥栄町, (滋) 瀬田, (和) 大島, (三) 長
島。本, 四, 九, 琉, 朝, 支, フィリピン。〔北村原
色離弁 652, 新牧野図鑑 290〕

双子葉植物追加 キク科

1 : No 1 の前に 兵生 2 (4-5) : 237 (1954)
Achillea millefolium L. セイヨウノコギリソウ
Ⅴ-Ⅴ, (滋) 比叡山ドライブウェイ, 牧野町黒川林道,
(和) 田辺市ビーチゴルフ場附近。ヨーロッパ原産帰化,
近畿へは 1966 年頃より道路工事の吹付工事にともなっ
て現れた。〔長田帰化図鑑 1〕

1 : No 7 の次へ 兵生 2 (4-5) : 237 (1954)
Ambrosia trifida L. オオブタクサ, クワモドキ
Ⅴ-Ⅴ, (兵) 汐川, 浜坂町, 南淡町, 芦屋市, 西宮,
村岡町, (京) 久美浜町, (大) 千早。北米原産帰化。
近畿へは 1958 年頃から帰化した。〔長田帰化図鑑 7〕

1 : No 93 の次へ 兵生 2 (4-5) : 242 (1954)
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore
ヘニバナボロギク Ⅴ-Ⅴ, (兵) 西宮, 戸倉, 青垣町,
(京) 比叡山, 雲ヶ畑, 笠置山, 大原野, 長岡京市,
(滋) 比良山, 竹生島, (大) 箕面, 金剛山, 東能勢村,
(和) 白浜町, 大塔村, (三) 井田村, 平倉, 神路山,
御座町。アフリカ原産帰化といわれる, 1951 年頃より
関西に現れた。〔長田帰化図鑑 43〕

1 : No 101 の次へ 兵生 2 (4-5) : 242 (1954)
Erigeron philadelphicus L. ハルジオオン Ⅴ-Ⅴ
(兵) 六甲山, 神戸市山田町, 赤穂市原, 丹南町南矢代,
(京) 出町柳, 京都市左京区, 深泥池畔, 亀岡, (滋)
打見山頂, (大) 能勢, (和) 田辺市。北米原産帰化,
近畿へは 1965 年頃から現れた。〔長田帰化図鑑 54〕

2 : No 107 の次へ 兵生 3 (1-2) : 42 (1955)
Galinsoga parviflora Cav. コゴメギク Ⅴ-Ⅴ,
花柄や総苞に腺毛がない。(兵) 御影。帰化, 少ない。
G. quadriradiata Reiz et Pavon (= *C. ciliata*
(Raf.) Blake 植分地 33 391 参照) ハキダメギク
花柄や総苞に腺毛がある。Ⅴ-Ⅴ, (兵) 神戸市, 三田
市, 豊岡市, (京) 亀岡, 綾部, 久美浜町, (滋) 五峯
村, (大) 金剛山。熱帯アメリカ原産帰化。〔長田帰化
図鑑 56〕

2 : No 116 の次へ 兵生 3 (1-2) : 43 (1955)
Hieracium umbellatum L. ヤナギタンポポ Ⅴ-
Ⅴ, (兵) 扇ノ山, 瀬川山, (滋) 比叡山(ドライブウ
ェイ工事にとまなう移入)。日本全土・南千島・樺太・
朝鮮・北半球一般。〔北村原色合弁 25, 牧野図鑑 26〕